

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

Прикладная математика

Открытый билет

Вариант 1

(с решениями)

Вопрос 1

Найдите наибольший общий делитель натуральных чисел: 180 и 150.

Решение

Разобьем решение на несколько шагов.

Первый шаг: найдем наибольший общий делитель чисел с помощью разложения на простые множители. Для этого каждое число будем делить на простой множитель до того момента, пока остаток не станет равен 1. Оформим деление в столбик.

Число	Делители	Число	Делители
180	2	150	2
90	2	75	5
45	5	15	5
9	3	3	3
3	3	1	
1			

Запишем разложение на простые множители в строчку:

$$180 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 3$$

$$150 = 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 3$$

Второй шаг: подчеркнем общие простые множители:

$$180 = \underline{2} \cdot 2 \cdot \underline{5} \cdot \underline{3} \cdot 3$$

$$150 = \underline{2} \cdot \underline{5} \cdot 5 \cdot \underline{3}$$

Третий шаг: найдем произведение подчеркнутых простых множителей одного числа. Оно и будет являться наибольшим общим делителем двух чисел.

$$2 \cdot 5 \cdot 3 = 30 - \text{наибольший общий делитель чисел 180 и 150.}$$

Правильный ответ: 30.

(3 балла)

Вопрос 2

Найдите значение выражения: $\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) \div \frac{1}{18}$.

a) 6

b) 9

c) $\frac{1}{36}$

d) 18

Решение

Выражение, записанное в скобках, приведем к общему знаменателю, а деление на $\frac{1}{18}$ заменим умножением на число 18. Выполнив элементарные преобразования, получаем:

$$\left(\frac{1 \cdot 2 + 1 \cdot 1}{6}\right) \cdot 18 = \frac{3}{6} \cdot 18 = \frac{1}{2} \cdot 18 = 9.$$

Правильный ответ: 9.

(3 балла)

Вопрос 3

Найдите значение выражения: $(4 - \sqrt{3}) \cdot (4 + \sqrt{3})$.

- a) 13
- b) 19
- c) 11
- d) $4\sqrt{3}$

Решение

Для нахождения значения данного выражения необходимо воспользоваться формулами сокращенного умножения. Разность квадратов определяется следующим образом: $a^2 - b^2 = (a - b) \cdot (a + b)$. В нашем случае $a = 4$, $b = \sqrt{3}$. Подставив данные значения в формулу, получаем:

$$(4 - \sqrt{3}) \cdot (4 + \sqrt{3}) = 4^2 - (\sqrt{3})^2 = 16 - 3 = 13.$$

Правильный ответ: 13.

(3 балла)

Вопрос 4

В городских спортивных соревнованиях приняли участие 12 десятиклассников, что составляет треть от общего числа десятиклассников. Сколько десятиклассников не приняли участия в соревнованиях?

- a) 4
- b) 36
- c) 24
- d) 12

Решение

Разобьем решение на несколько шагов.

Первый шаг. Определим общее число десятиклассников. Для этого составим пропорцию, зная, что 12 человек – это одна треть от общего числа. Обозначим общее число десятиклассников x .

$$12 \text{ человек} - \frac{1}{3},$$

$$x \text{ человек} - 1.$$

Получим уравнение, из которого найдем неизвестное x : $\frac{1}{3}x = 12$. Откуда $x = 12 \cdot 3 = 36$. Получили, что общее число десятиклассников – 36 человек.


Второй шаг. Определим количество десятиклассников, не принявших участие в олимпиаде. Известно, что всего десятиклассников 36, приняли участие в олимпиаде – 12. Следовательно, количество десятиклассников, не принявших участие в олимпиаде, определяется таким образом: $36 - 12 = 24$.

Правильный ответ: 24.

(3 балла)

Вопрос 5

На графике изображена зависимость скорости движения рейсового автобуса от времени. На вертикальной оси отмечена скорость автобуса (км/ч), на горизонтальной – время (мин), прошедшее с начала движения автобуса.



Пользуясь графиком, укажите характеристику скорости движения рейсового автобуса для интервала времени 12–16 мин.

1. Была остановка длительностью 2 мин.
2. Скорость не меньше 20 км/ч на всем интервале.
3. Скорость не больше 60 км/ч.
4. Была остановка длительностью ровно 1 мин.

Решение





Проанализируем варианты ответа и посмотрим на график в интервале 12–16 мин. Варианты 1, 4 неверные, так как на всем интервале 12–16 мин нет участков, на которых скорость была бы равна нулю. Вариант 3 тоже неверный, так как максимальная скорость на интервале 12–16 мин составляет 100 км/ч. Проверим вариант 2. По графику видим, что минимальная скорость на интервале 12–16 составляет 20 км/ч (в момент времени = 16 мин). В остальные интервалы времени скорость выше 20 км/ч. Следовательно, можно сделать вывод о том, что на всем интервале 12–16 скорость автобуса не меньше 20 км/ч.

Правильный ответ: 2.

(3 балла)

Вопрос 6

Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.

А	Б	В	Г
			

Характеристики функций:

1. Функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$.
2. Функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$.
3. Функция убывает на отрезке $[-1; 1]$.
4. Функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$.

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	Б	В	Г

Решение

Точка максимума – это такая внутренняя точка графика, где значение функции больше, чем во всех достаточно близких к ней точках. На графике она выглядит как локальный «холмик». Следовательно, характеристике «функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой А.

Точка минимума – такая внутренняя точка графика, где значение функции меньше, чем во всех достаточно близких к ней точках. На графике выглядит как локальная «ямка». Следовательно, характеристике «функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой Б.

Функция $y = f(x)$ убывает на множестве M , если для любых x_1 и x_2 , принадлежащих множеству M , из неравенства $x_2 > x_1$ следует неравенство $f(x_2) < f(x_1)$. Следовательно, характеристике «функция убывает на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой В.

Функция $y = f(x)$ возрастает на множестве M , если для любых x_1 и x_2 , принадлежащих множеству M , из неравенства $x_2 > x_1$ следует неравенство $f(x_2) > f(x_1)$. Следовательно, характеристике «функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой Г.

Правильный ответ:

А	Б	В	Г
1	2	3	4

(6 баллов)

Вопрос 7

Найдите значение выражения: $\frac{30 \sin 79^\circ \cdot \cos 79^\circ}{\sin 158^\circ}$.

Решение

Воспользуемся тригонометрической формулой двойного угла:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha.$$

Числитель выражения в соответствии с формулой двойного угла преобразуется следующим образом:

$$30 \sin 79^\circ \cdot \cos 79^\circ = 15 \cdot 2 \cdot \sin 79^\circ \cdot \cos 79^\circ = 15 \cdot \sin(2 \cdot 79^\circ) = 15 \sin 158^\circ.$$

Подставим полученное выражение в исходное вместо числителя, в итоге получим:

$$\frac{30 \sin 79^\circ \cdot \cos 79^\circ}{\sin 158^\circ} = \frac{15 \sin 158^\circ}{\sin 158^\circ} = 15.$$

Правильный ответ: 15.

(3 балла)

Вопрос 8

Решите уравнение: $x^2 - 17x + 72 = 0$.

Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них.

- a) 8
- b) 9
- c) -8
- d) -9

Решение

Если в квадратном уравнении вида: $ax^2 + bx + c = 0$ коэффициент $a = 1$, то можно воспользоваться теоремой Виета. Согласно данной теореме, произведение корней равно свободному члену c , а сумма корней коэффициенту b , взятому с противоположным знаком. То есть $x_1 \cdot x_2 = c$, $x_1 + x_2 = -b$. Зададимся вопросом: произведение каких двух чисел равно 72? Очевидно, что это числа 8

и 9. Сумма этих чисел равна 17, то есть коэффициенту b , взятому с противоположным знаком. Получили: $x_1 = 8$, $x_2 = 9$. В задаче требуется в качестве ответа указать больший корень. Больший корень равен 9.

Правильный ответ: 9.

(4 балла)

Вопрос 9

Решите систему уравнений:
$$\begin{cases} 10x + 2y = 120, \\ -15x + 2y = -60. \end{cases}$$

Укажите в ответе, чему равен y .

Решение

Распишем решение по шагам.

Первый шаг. Выразим из первого уравнения системы $2y$. Выражаем $2y$, потому что во втором уравнении также встречается $2y$.

$$2y = 120 - 10x$$

Второй шаг. Подставим полученное выражение во второе уравнение и найдем x .

$$-15x + (120 - 10x) = -60$$

$$-15x + 120 - 10x = -60$$

$$-25x = -60 - 120$$

$$-25x = -180$$

$$x = 7.2$$

Третий шаг. Подставим найденное значение x в выражение для y , полученное на первом шаге, и найдем y .

$$2y = 120 - 10 \cdot 7.2$$

$$2y = 120 - 72$$

$$2y = 48$$

$$y = 24$$

В задаче требуется в качестве ответа указать, чему равен y . Получили $y = 24$.

Правильный ответ: 24.

(4 балла)

Вопрос 10

Решите неравенство: $2x - 2(3x - 1) > 6$.

- a) $x > -1$
- b) $x > 1$
- c) $x \leq -1$
- d) $x < -1$

Решение

Чтобы решить неравенство, сначала нужно решить соответствующее уравнение:

$$2x - 2(3x - 1) = 6$$

$$2x - 6x + 2 = 6$$

$$-4x = 4. \text{ Откуда } x = -1.$$

Данный корень является точкой смены знака в неравенстве. Возьмем точку, расположенную на числовой оси левее точки $x = -1$. Одной из таких точек будет точка $x = -2$. Подставим $x = -2$ в исходное неравенство и проверим знак.

$$2 \cdot (-2) - 2(3 \cdot (-2) - 1) > 6$$

$$-4 - 2 \cdot (-7) > 6$$

$$10 > 6$$

Видно, что неравенство выполняется. Следовательно, решение неравенства будет на числовой оси левее точки $x = -1$, то есть при $x < -1$.

Правильный ответ: $x < -1$.

(4 балла)

Вопрос 11

Найдите производную функции: $f(x) = x^5 + 2x^2 + 50$. В ответ запишите значение производной в точке $x = 2$.

- a) 88
- b) 102
- c) 50
- d) 80

Решение

Для нахождения производной воспользуемся таблицей производных.

Найдем в таблице производную степенной функции: $(x^n)' = nx^{n-1}$. Учтем, что производная константы равна нулю, а производная алгебраической суммы нескольких функций равна алгебраической сумме производных этих функций, то есть $(U + V)' = U' + V'$.

Следовательно, производная функции $f(x)$ равна:

$$f'(x) = (x^5)' + 2(x^2)' + (50)' = 5x^{5-1} + 2 \cdot 2x^{2-1} + 0 = 5x^4 + 4x.$$

Вычислим значение производной функции в точке $x = 2$. Для этого подставим в полученную производную $x = 2$:


$$f'(2) = 5 \cdot 2^4 + 4 \cdot 2 = 5 \cdot 16 + 8 = 88.$$

Правильный ответ: 88.

(6 баллов)

Вопрос 12

Даны два шара радиусами 6 и 3. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего?



- a) 9
- b) 4
- c) 3
- d) 2

Решение

Применим формулу для нахождения площади поверхности шара: $S = 4\pi R^2$. Обозначим площадь поверхности большего шара и его радиус как S_2 и R_2 , площадь поверхности меньшего шара и его радиус – S_1 и R_1 . Запишем отношение площади большего шара к площади меньшего шара, подставив в формулу радиусы шаров:

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{4\pi R_2^2}{4\pi R_1^2} = \frac{R_2^2}{R_1^2} = \frac{6^2}{3^2} = \frac{36}{9} = 4.$$

Получили, что площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего шара в 4 раза.

Правильный ответ: 4.

(4 балла)


Вопрос 13

В треугольнике ABC угол A равен 90° , $\operatorname{tg} B = \sqrt{3}$, $AC = 8$. Найдите BC .

Ответ запишите в виде целого числа или конечной десятичной дроби, округлив до двух знаков после запятой.

Решение

Для наглядности построим прямоугольный треугольник:



Известно, что катет прямоугольного треугольника равен произведению гипотенузы на синус противолежащего ему угла. Длина катета AC известна по условию задачи, также известен тангенс противолежащего этому катету угла B . Следовательно, найдя угол B , мы сможем вычислить гипотенузу. По условию задачи, $\operatorname{tg} B = \sqrt{3}$, значит, угол $B = \operatorname{arctg}(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$. Запишем выражение в соответствии с тем, что катет прямоугольного треугольника равен произведению гипотенузы на синус противолежащего ему угла: $AC = BC \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

Известно, что $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, а катет $AC = 8$ по условию задачи. Получаем:

$$8 = BC \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}. \text{ Из данного выражения находим } BC: BC = \frac{16}{\sqrt{3}} \approx 9.24.$$

Правильный ответ: 9.24.

(8 баллов)

Вопрос 14

Решите уравнение: $16 \cdot 4^{x^2+12} = 4^{-2x+22}$. Если уравнение имеет более одного корня, то в ответе запишите сумму всех его корней.

Решение

Легко заметить, что число 16 можно представить следующим образом:

$$16 = 4^2.$$

С учетом этого факта перепишем уравнение в следующем виде:

$$4^2 \cdot 4^{x^2+12} = 4^{-2x+22}.$$

Известно, что при умножении степеней с одинаковыми основаниями основание оставляем без изменений, а показатели степеней складываем. Соответственно, выражение принимает вид:

$$4^{2+x^2+12} = 4^{-2x+22}.$$

Чтобы найти неизвестное x , необходимо приравнять степени:

$$2 + x^2 + 12 = -2x + 22.$$

Перенесем все члены уравнения в левую часть и получим квадратное уравнение, решив которое, найдем неизвестные x :

$$x^2 + 2x - 8 = 0.$$

Так как коэффициент при $x^2 = 1$, то найдем корни уравнения по теореме Виета. Согласно данной теореме, $x_1 \cdot x_2 = -8$, $x_1 + x_2 = -2$.

Получаем: $x_1 = -4$, $x_2 = 2$.

По условию задачи, в ответ необходимо записать сумму корней:

$$-4 + 2 = -2.$$

Правильный ответ: -2 .

(8 баллов)

Вопрос 15

Найдите $8\cos(2\pi + \beta) + 10\sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right)$, если $\cos\beta = -\frac{1}{9}$.

Ответ запишите в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

Решение

Для решения данной задачи воспользуемся тригонометрическими формулами:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta,$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta.$$

Запишем $\cos(2\pi + \beta)$ в соответствии с формулой косинуса суммы углов:

$$\cos(2\pi + \beta) = \cos 2\pi \cdot \cos \beta - \sin 2\pi \cdot \sin \beta.$$

Известно, что $\cos 2\pi = 1$, $\sin 2\pi = 0$. Также по условию задачи задано:

$$\cos \beta = -\frac{1}{9}.$$

В соответствии с этим перепишем выражение:

$$\cos(2\pi + \beta) = \cos 2\pi \cdot \cos \beta - \sin 2\pi \cdot \sin \beta = 1 \cdot \left(-\frac{1}{9}\right) - 0 \cdot \sin \beta = -\frac{1}{9}.$$

Запишем $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right)$ в соответствии с формулой синуса суммы углов:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \cos \beta + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin \beta.$$

Известно, что $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. Также по условию задачи задано:

$$\cos \beta = -\frac{1}{9}.$$

В соответствии с этим перепишем выражение:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) = 1 \cdot \left(-\frac{1}{9}\right) + 0 \cdot \sin \beta = -\frac{1}{9}.$$

Подставим полученные значения в исходное выражение и получим окончательный ответ:

$$8\cos(2\pi + \beta) + 10\sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) = 8 \cdot \left(-\frac{1}{9}\right) + 10 \cdot \left(-\frac{1}{9}\right) = -\frac{8}{9} - \frac{10}{9} = -\frac{18}{9} = -2.$$

Правильный ответ: -2 .

(12 баллов)

Вопрос 16

Найдите все значения a , при которых уравнение $(a - 2)x^2 + 2(a - 2)x + 2 = 0$ не имеет действительных корней.

- a) $a \in [2; 4)$
- b) $a \in (2; 4)$
- c) $a \in [2; 4]$
- d) $a = 1$
- e) $a = 2$
- f) $a > \frac{11}{9}$
- g) $a \in [3; 3.75]$
- h) $a > 6$
- i) $a = -12$

Решение

Имеем дело с квадратным уравнением, однако в случае, когда коэффициент при x^2 равен нулю, уравнение станет линейным. Рассмотрим два случая: 1) уравнение линейное и 2) уравнение квадратное.

1. Уравнение будет линейным, если $(a - 2) = 0$, то есть $a = 2$. При данном значении параметра a уравнение примет вид: $2 = 0$. Оно не имеет действительных корней. Один из ответов на поставленный в задаче вопрос найден.

2. Уравнение будет квадратным, если $a \neq 2$. Оно не имеет действительных корней тогда и только тогда, когда его дискриминант отрицателен. Найдем дискриминант: $D = b^2 - 4ac = 4(a - 2)^2 - 8(a - 2) < 0$.

$$(a - 2)(a - 4) < 0.$$

Решение данного неравенства: $a \in (2; 4)$.

С учетом пункта 1 получаем ответ: $a \in [2; 4)$.

Правильный ответ: $a \in [2; 4)$.

(13 баллов)

Вопрос 17

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $\sqrt{x+2a-1} + \sqrt{x-a} = 1$ имеет хотя бы один корень.

а) $0 \leq a \leq \frac{2}{3}$

б) $a \in (2; 4)$

в) $a \in [2; 4)$

г) $a = 1$

д) $a = 2$

е) $a < \frac{2}{3}$

ж) $a \in \left[-\frac{2}{3}; 0\right]$

з) $a > 6$

е) $a = -12$

Решение

Сделаем замену переменных: $\sqrt{x+2a-1} = t$, $\sqrt{x-a} = z$, где $t \geq 0$ и $z \geq 0$.

Тогда $x+2a-1 = t^2$, $x-a = z^2$.

Выразим из обоих уравнений x и приравняем:

$$x = t^2 + 1 - 2a$$

$$x = z^2 + a$$

$$t^2 + 1 - 2a = z^2 + a$$

Исходное уравнение с учетом замены получилось таким: $t + z = 1$.

Получаем систему уравнений:
$$\begin{cases} t + z = 1, \\ t^2 + 1 - 3a = z^2. \end{cases}$$

Эта система должна иметь хотя бы одно решение, такое, что $t \geq 0$, $z \geq 0$.

Из первого уравнения найдем z : $t = 1 - z \Rightarrow 1 - z \geq 0 \Rightarrow z \leq 1$. Аналогично $t \leq 1$.

Второе уравнение:

$$t^2 - z^2 = 3a - 1$$

$$(t - z)(t + z) = 3a - 1$$

Получим систему:
$$\begin{cases} t + z = 1, \\ (t - z)(t + z) = 3a - 1. \end{cases}$$

Найдем сумму и разность уравнений системы и получим:
$$\begin{cases} t = \frac{3}{2}a, \\ z = \frac{2 - 3a}{2}. \end{cases}$$

Нужно найти, при каких значениях параметра a система имеет хотя бы одно решение: $0 \leq t \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$.

Запишем условия для параметра:
$$\begin{cases} 0 \leq 3a \leq 2, \\ 0 \leq \frac{2 - 3a}{2} \leq 1. \end{cases}$$

Найдем решения обоих неравенств. Оба неравенства дают решение:

$$0 \leq a \leq \frac{2}{3}.$$

При этом $0 \leq t \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ исходное уравнение имеет хотя бы одно решение.

Правильный ответ: $0 \leq a \leq \frac{2}{3}$.

(13 баллов)

Вариант 2
(с решениями)

Вопрос 1

Найдите наибольший общий делитель натуральных чисел: 225 и 400.

Решение

Разобьем решение на несколько шагов.

Первый шаг: найдем наибольший общий делитель чисел с помощью разложения на простые множители. Для этого каждое число будем делить на простой множитель до того момента, пока остаток не станет равен 1. Оформим деление в столбик.

Число	Делители	Число	Делители
225	3	400	2
75	3	200	2
25	5	100	2
5	5	50	2
1		25	5
		5	5
		1	

Запишем разложение на простые множители в строчку:

$$225 = 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$$

$$400 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5$$

Второй шаг: подчеркнем общие простые множители:

$$225 = 3 \cdot 3 \cdot \underline{5} \cdot \underline{5}$$

$$400 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \underline{5} \cdot \underline{5}$$

Третий шаг: найдем произведение подчеркнутых простых множителей одного числа. Оно и будет являться наибольшим общим делителем двух чисел.

$$5 \cdot 5 = 25 \text{ – наибольший общий делитель чисел 225 и 400.}$$

Правильный ответ: 25.

(3 балла)

Вопрос 2

Найдите значение выражения: $\left(\frac{2}{3} + \frac{5}{6}\right) \div \frac{1}{2}$.

Решение

Выражение, записанное в скобках, приведем к общему знаменателю, а деление на $\frac{1}{2}$ заменим умножением на число 2. Выполнив элементарные преобразования, получаем:

$$\left(\frac{2 \cdot 2 + 1 \cdot 5}{6}\right) \cdot 2 = \frac{9}{6} \cdot 2 = \frac{3}{2} \cdot 2 = 3.$$

Правильный ответ: 3.

(3 балла)

Вопрос 3

Найдите значение выражения: $(3\sqrt{15} + 5) \cdot (3\sqrt{15} - 5)$.

Решение

Для нахождения значения данного выражения необходимо воспользоваться формулами сокращенного умножения. Разность квадратов определяется следующим образом: $a^2 - b^2 = (a - b) \cdot (a + b)$. В нашем случае $a = 3\sqrt{15}$, $b = 5$. Подставив данные значения в формулу, получаем:

$$(3\sqrt{15} + 5) \cdot (3\sqrt{15} - 5) = (3\sqrt{15})^2 - 5^2 = 3^2 \cdot 15 - 25 = 135 - 25 = 110.$$

Правильный ответ: 110.

(3 балла)

Вопрос 4

Пицца стоит 710 руб. Студентам пиццерия делает скидку 5%. Сколько рублей стоит пицца для студента?

Решение

Найдем размер скидки в рублях, зная процент скидки и стоимость пиццы:

$$710 \cdot 0,05 = 35,50 \text{ руб.}$$

Следовательно, для студента пицца стоит:


$$710 - 35,50 = 674,50 \text{ руб.}$$

Правильный ответ: 674,50.

(3 балла)

Вопрос 5

На графике изображена зависимость скорости движения рейсового автобуса от времени. На вертикальной оси отмечена скорость автобуса (км/ч), на горизонтальной – время (мин), прошедшее с начала движения автобуса.



Пользуясь графиком, укажите характеристику скорости движения рейсового автобуса для интервала времени 9–11 мин.

1. Была остановка длительностью 2 мин.
2. Скорость не меньше 20 км/ч на всем интервале.
3. Скорость не больше 60 км/ч.
4. Была остановка длительностью 1 мин.

Решение


Проанализируем варианты ответа и посмотрим на график в интервале 9–11 мин. Из графика видно, что на всем данном интервале скорость равна нулю. Следовательно, у автобуса на интервале 9–11 мин была остановка длительностью 2 мин.

Правильный ответ: 1.

(3 балла)

Вопрос 6

Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.



Характеристики функций:

1. Функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$.
2. Функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$.
3. Функция убывает на отрезке $[-1; 1]$.
4. Функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$.

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	Б	В	Г

Решение

Точка максимума – это такая внутренняя точка графика, где значение функции больше, чем во всех достаточно близких к ней точках. На графике она выглядит как локальный «холмик». Следовательно, характеристике «функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой Б.

Точка минимума – такая внутренняя точка графика, где значение функции меньше, чем во всех достаточно близких к ней точках. На графике она выглядит как локальная «ямка». Следовательно, характеристике «функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой В.

Функция $y = f(x)$ убывает на множестве M , если для любых x_1 и x_2 , принадлежащих множеству M , из неравенства $x_2 > x_1$ следует неравенство $f(x_2) < f(x_1)$. Следовательно, характеристике «функция убывает на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой А.

Функция $y = f(x)$ возрастает на множестве M , если для любых x_1 и x_2 , принадлежащих множеству M , из неравенства $x_2 > x_1$ следует неравенство $f(x_2) > f(x_1)$. Следовательно, характеристике «функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой Г.

Правильный ответ:

А	Б	В	Г
3	1	2	4

(6 баллов)

Вопрос 7

Найдите значение выражения: $\frac{3 \sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ}{\sin 240^\circ}$.

Решение

Воспользуемся тригонометрической формулой двойного угла:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha.$$

Числитель выражения в соответствии с формулой двойного угла преобразуется следующим образом:

$$3\sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ = 1,5 \cdot 2 \cdot \sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ = 1,5 \cdot \sin(2 \cdot 120^\circ) = 1,5 \sin 240^\circ.$$

Подставим полученное выражение в исходное вместо числителя, в итоге получим:

$$\frac{3\sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ}{\sin 240^\circ} = \frac{1,5 \sin 240^\circ}{\sin 240^\circ} = 1,5.$$

Правильный ответ: 1,5.

(3 балла)

Вопрос 8

Решите уравнение: $x^2 - 14x + 40 = 0$.

Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них.

Решение

Если в квадратном уравнении вида $ax^2 + bx + c = 0$ коэффициент $a = 1$, то можно воспользоваться теоремой Виета. Согласно данной теореме, произведение корней равно свободному члену c , а сумма корней коэффициенту b , взятому с противоположным знаком. То есть $x_1 \cdot x_2 = c$, $x_1 + x_2 = -b$. Зададимся вопросом: произведение каких двух чисел равно 40? Очевидно, что это числа 4 и 10. Сумма этих чисел равна 14, то есть коэффициенту b , взятому с противоположным знаком. Получили: $x_1 = 4$, $x_2 = 10$. В задаче требуется в качестве ответа указать больший корень. Больший корень = 10.

Правильный ответ: 10.

(4 балла)

Вопрос 9

Решите систему уравнений:
$$\begin{cases} 10x + 2y = 120, \\ -15x + y = -60. \end{cases}$$

Укажите в ответе, чему равен y .

Решение

Распишем решение по шагам.

Первый шаг. Выразим из второго уравнения системы y .

$$y = -60 + 15x$$

Второй шаг. Подставим полученное выражение в первое уравнение вместо y и найдем x .

$$10x + 2(-60 + 15x) = 120$$

$$10x - 120 + 30x = 120$$

$$40x = 120 + 120$$

$$40x = 240$$

$$x = 6$$

Третий шаг. Подставим найденное значение x в выражение для y , полученное на первом шаге, и найдем y .

$$y = -60 + 15 \cdot 6 = -60 + 90 = 30.$$

В задаче требуется в качестве ответа указать, чему равен y . Получили $y = 30$.

Правильный ответ: 30.

(4 балла)

Вопрос 10

Решите неравенство: $2x - 2(3x - 1) > 2$.

a) $x > 4$

b) $x < 1$

c) $x < 0$

d) $x > 2$

Решение

Чтобы решить неравенство, сначала нужно решить соответствующее уравнение:

$$2x - 2(3x - 1) = 2$$

$$2x - 6x + 2 = 2$$

$$-4x = 0. \text{ Откуда } x = 0.$$

Данный корень является точкой смены знака в неравенстве. Возьмем точку, расположенную на числовой оси левее точки $x = 0$. Одной из таких точек будет точка $x = -1$. Подставим $x = -1$ в исходное неравенство и проверим знак.

$$2 \cdot (-1) - 2(3 \cdot (-1) - 1) > 2$$

$$-2 - 2 \cdot (-4) > 2$$

$$6 > 2$$

Видно, что неравенство выполняется. Следовательно, решение неравенства будет на числовой оси левее точки $x = 0$, то есть при $x < 0$.

Правильный ответ: $x < 0$.

(4 балла)

Вопрос 11

Найдите производную функции: $f(x) = x^6 + 5x^3 - 10x^2 + 100$. В ответ запишите значение производной в точке $x = 1$.

Решение

Для нахождения производной воспользуемся таблицей производных.

Найдем в таблице производную степенной функции: $(x^n)' = nx^{n-1}$. Учтем, что производная константы равна нулю, а также что производная алгебраической суммы нескольких функций равна алгебраической сумме производных этих функций, то есть $(U + V)' = U' + V'$.

Следовательно, производная функции $f(x)$ равна:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^6)' + 5(x^3)' - 10(x^2)' + (100)' = 6x^{6-1} + 5 \cdot 3x^{3-1} - 10 \cdot 2x^{2-1} + 0 = \\ &= 6x^5 + 15x^2 - 20x. \end{aligned}$$

Вычислим значение производной функции в точке $x = 1$. Для этого подставим в полученную производную $x = 1$:


$$f'(1) = 6 \cdot 1^5 + 15 \cdot 1^2 - 20 \cdot 1 = 6 + 15 - 20 = 1.$$

Правильный ответ: 1.

(6 баллов)

Вопрос 12

Даны два шара радиусами 12 и 4. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего?



Решение

Применим формулу для нахождения площади поверхности шара: $S = 4\pi R^2$. Обозначим площадь поверхности большего шара и его радиус как S_2 и R_2 , площадь поверхности меньшего шара и его радиус – S_1 и R_1 . Запишем отношение площади большего шара к площади меньшего шара, подставив в формулу радиусы шаров:

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{4\pi R_2^2}{4\pi R_1^2} = \frac{R_2^2}{R_1^2} = \frac{12^2}{4^2} = \frac{144}{16} = 9.$$

Получили, что площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего шара в 9 раз.

Правильный ответ: 9.

(4 балла)


Вопрос 13

В треугольнике ABC угол A равен 90° , $\operatorname{ctg} B = \sqrt{3}$, $AC = 10$. Найдите BC .

Ответ запишите в виде целого числа или конечной десятичной дроби, округлив до двух знаков после запятой.

Решение

Для наглядности построим прямоугольный треугольник:



Известно, что катет прямоугольного треугольника равен произведению гипотенузы на синус противолежащего ему угла. Длина катета AC известна по условию задачи, также известен тангенс противолежащего этому катету угла B . Следовательно, найдя угол B , мы сможем вычислить гипотенузу.

По условию задачи, $\operatorname{ctg} B = \sqrt{3}$, значит, угол $B = \operatorname{arccotg}(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{6}$. Запишем выра-

жение в соответствии с тем, что катет прямоугольного треугольника равен произведению гипотенузы на синус противолежащего ему угла: $AC = BC \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

Известно, что $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$, а катет $AC = 10$ по условию задачи. Получаем:

$$10 = BC \cdot \frac{1}{2}. \text{ Из данного выражения находим } BC: BC = 20.$$

Правильный ответ: 20.

(8 баллов)

Вопрос 14

Решите уравнение: $81 \cdot 3^{2(x^2+4)} = 3^{x^2-5x+6}$. Если уравнение имеет более одного корня, то в ответе запишите сумму всех его корней.

Решение

Легко заметить, что число 81 можно представить следующим образом:

$$81 = 3^4.$$

С учетом этого факта перепишем уравнение в следующем виде:

$$3^4 \cdot 3^{2(x^2+4)} = 3^{x^2-5x+6}.$$

Известно, что при умножении степеней с одинаковыми основаниями основание оставляем без изменений, а показатели степеней складываем. Соответственно, выражение принимает вид:

$$3^{4+2(x^2+4)} = 3^{x^2-5x+6}.$$

Чтобы найти неизвестное x , необходимо приравнять степени:

$$4 + 2(x^2 + 4) = x^2 - 5x + 6.$$

Перенесем все члены уравнения в левую часть:

$$4 + 2x^2 + 8 - x^2 + 5x - 6 = 0$$

и получим квадратное уравнение: $x^2 + 5x + 6 = 0$.

Так как коэффициент при $x^2 = 1$, то найдем корни уравнения по теореме Виета. Согласно данной теореме, $x_1 \cdot x_2 = 6$, $x_1 + x_2 = -5$.

Получаем: $x_1 = -2$, $x_2 = -3$.

По условию задачи, в ответ необходимо записать сумму корней:

$$-2 - 3 = -5.$$

Правильный ответ: -5 .

(8 баллов)

Вопрос 15

Найдите $8\cos(2\pi + \beta) + 10\sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right)$, если $\cos\beta = \frac{2}{9}$.

Ответ запишите в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

Решение

Для решения данной задачи воспользуемся тригонометрическими формулами:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta - \sin\alpha \cdot \sin\beta,$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta + \cos\alpha \cdot \sin\beta.$$

Запишем $\cos(2\pi + \beta)$ в соответствии с формулой косинуса суммы углов:

$$\cos(2\pi + \beta) = \cos 2\pi \cdot \cos\beta - \sin 2\pi \cdot \sin\beta.$$

Известно, что $\cos 2\pi = 1$, $\sin 2\pi = 0$. Также по условию задачи задано:

$$\cos\beta = \frac{2}{9}.$$

В соответствии с этим перепишем выражение:

$$\cos(2\pi + \beta) = \cos 2\pi \cdot \cos\beta - \sin 2\pi \cdot \sin\beta = 1 \cdot \frac{2}{9} - 0 \cdot \sin\beta = \frac{2}{9}.$$

Запишем $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right)$ в соответствии с формулой синуса суммы углов:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \cos\beta + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin\beta.$$

Известно, что $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. Также по условию задачи задано:

$$\cos\beta = \frac{2}{9}.$$

В соответствии с этим перепишем выражение:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) = 1 \cdot \frac{2}{9} + 0 \cdot \sin\beta = \frac{2}{9}.$$

Подставим полученные значения в исходное выражение и получим окончательный ответ:

$$8\cos(2\pi + \beta) + 10\sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) = 8 \cdot \frac{2}{9} + 10 \cdot \frac{2}{9} = \frac{16}{9} + \frac{20}{9} = \frac{36}{9} = 4.$$

Правильный ответ: 4.

(12 баллов)

Вопрос 16

Найдите все значения a , при которых уравнение $(a-2)x^2 + 2(a-2)x + 2 = 0$ не имеет действительных корней.

- a) $a \in [2; 4)$
- b) $a \in (2; 4)$
- c) $a \in [2; 4]$
- d) $a = 1$
- e) $a = 2$
- f) $a > \frac{11}{9}$
- g) $a \in [3; 3.75]$
- h) $a > 6$
- i) $a = -12$

Решение

Имеем дело с квадратным уравнением, однако в случае, когда коэффициент при x^2 равен нулю, уравнение станет линейным. Рассмотрим два случая: 1) уравнение линейное и 2) уравнение квадратное.

1. Уравнение будет линейным, если $(a - 2) = 0$, то есть $a = 2$. При данном значении параметра a уравнение примет вид: $2 = 0$. Оно не имеет действительных корней. Один из ответов на поставленный в задаче вопрос найден.

2. Уравнение будет квадратным, если $a \neq 2$. Оно не имеет действительных корней тогда и только тогда, когда его дискриминант отрицателен. Найдем дискриминант:

$$D = b^2 - 4ac = 4(a - 2)^2 - 8(a - 2) < 0.$$

$$(a - 2)(a - 4) < 0.$$

Решение данного неравенства: $a \in (2; 4)$.

С учетом пункта 1 получаем ответ: $a \in [2; 4)$.

Правильный ответ: $a \in [2; 4)$.

(13 баллов)

Вопрос 17

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $\sqrt{x + 2a - 1} + \sqrt{x - a} = 1$ имеет хотя бы один корень.

a) $0 \leq a \leq \frac{2}{3}$

b) $a \in (2; 4)$

c) $a \in [2; 4)$

d) $a = 1$

e) $a = 2$

f) $a < \frac{2}{3}$

g) $a \in \left[-\frac{2}{3}; 0\right]$

h) $a > 6$

i) $a = -12$

Решение

Сделаем замену переменных: $\sqrt{x+2a-1} = t$, $\sqrt{x-a} = z$, где $t \geq 0$ и $z \geq 0$.

Тогда $x+2a-1 = t^2$, $x-a = z^2$.

Выразим из обоих уравнений x и приравняем:

$$x = t^2 + 1 - 2a$$

$$x = z^2 + a$$

$$t^2 + 1 - 2a = z^2 + a$$

Исходное уравнение с учетом замены получилось таким: $t + z = 1$.

Получаем систему уравнений:
$$\begin{cases} t + z = 1, \\ t^2 + 1 - 3a = z^2. \end{cases}$$

Эта система должна иметь хотя бы одно решение, такое, что $t \geq 0$, $z \geq 0$.

Из первого уравнения найдем z : $t = 1 - z \Rightarrow 1 - z \geq 0 \Rightarrow z \leq 1$. Аналогично $t \leq 1$.

Второе уравнение:

$$t^2 - z^2 = 3a - 1$$

$$(t - z)(t + z) = 3a - 1$$

Получим систему:
$$\begin{cases} t + z = 1, \\ (t - z)(t + z) = 3a - 1. \end{cases}$$

Найдем сумму и разность уравнений системы и получим:
$$\begin{cases} t = \frac{3}{2}a, \\ z = \frac{2-3a}{2}. \end{cases}$$

Нужно найти, при каких значениях параметра a система имеет хотя бы одно решение: $0 \leq t \leq 1, 0 \leq z \leq 1$.

Запишем условия для параметра:
$$\begin{cases} 0 \leq 3a \leq 2, \\ 0 \leq \frac{2-3a}{2} \leq 1. \end{cases}$$

Найдем решения обоих неравенств. Оба неравенства дают решение:

$$0 \leq a \leq \frac{2}{3}.$$

При этом $0 \leq t \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ исходное уравнение имеет хотя бы одно решение.

Правильный ответ: $0 \leq a \leq \frac{2}{3}$.

(13 баллов)

Вариант 3
(с решениями)

Вопрос 1

Найдите наибольший общий делитель натуральных чисел: 84 и 128.

Решение

Разобьем решение на несколько шагов.

Первый шаг: найдем наибольший общий делитель чисел с помощью разложения на простые множители. Для этого каждое число будем делить на простой множитель до того момента, пока остаток не станет равен 1. Оформим деление в столбик.

Число	Делители	Число	Делители
84	2	128	2
42	2	64	2
21	3	32	2
7	7	16	2
1		8	2
		4	2
		2	2
		1	2

Запишем разложение на простые множители в строчку:

$$84 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$$

$$128 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$$

Второй шаг: подчеркнем общие простые множители:

$$84 = \underline{2} \cdot \underline{2} \cdot 3 \cdot 7$$

$$128 = \underline{2} \cdot \underline{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$$

Третий шаг: найдем произведение подчеркнутых простых множителей одного числа. Оно и будет являться наибольшим общим делителем двух чисел.

$$2 \cdot 2 = 4 \text{ – наибольший общий делитель чисел 84 и 128.}$$

Правильный ответ: 4.

(3 балла)

Вопрос 2

Найдите значение выражения: $\left(\frac{2}{3} + \frac{7}{6}\right) \div \frac{1}{6}$.

Решение

Выражение, записанное в скобках, приведем к общему знаменателю, а деление на $\frac{1}{6}$ заменим умножением на число 6. Выполнив элементарные преобразования, получаем:

$$\left(\frac{2 \cdot 2 + 1 \cdot 7}{6}\right) \cdot 6 = \frac{11}{6} \cdot 6 = 11.$$

Правильный ответ: 11.

(3 балла)

Вопрос 3

Найдите значение выражения: $(2\sqrt{15} + 5) \cdot (2\sqrt{15} - 5)$.

Решение

Для нахождения значения данного выражения необходимо воспользоваться формулами сокращенного умножения. Разность квадратов определяется следующим образом: $a^2 - b^2 = (a - b) \cdot (a + b)$. В нашем случае $a = 2\sqrt{15}$, $b = 5$. Подставив данные значения в формулу, получаем:

$$(2\sqrt{15} + 5) \cdot (2\sqrt{15} - 5) = (2\sqrt{15})^2 - 5^2 = 2^2 \cdot 15 - 25 = 60 - 25 = 35.$$

Правильный ответ: 35.

(3 балла)

Вопрос 4

Пицца стоит 690 руб. Пенсионерам пиццерия делает скидку 10%. Сколько рублей стоит пицца для пенсионера?

Решение

Найдем размер скидки в рублях, зная процент скидки и стоимость пиццы:

$$690 \cdot 0,10 = 69 \text{ руб.}$$

Следовательно, для пенсионера пицца стоит:


$$690 - 69 = 621 \text{ руб.}$$

Правильный ответ: 621.

(3 балла)

Вопрос 5

На графике изображена зависимость скорости движения рейсового автобуса от времени. На вертикальной оси отмечена скорость автобуса (км/ч), на горизонтальной – время (мин), прошедшее с начала движения автобуса.



Пользуясь графиком, укажите характеристику скорости движения рейсового автобуса для интервала времени 1–3 мин.

1. Была остановка длительностью 2 мин.
2. Скорость не больше 20 км/ч на всем интервале
3. Скорость составляла 60 км/ч на всем интервале
4. Была остановка длительностью 1 мин.

Решение





Проанализируем варианты ответа и посмотрим на график в интервале 1–3 мин. Варианты 1 и 4 неверные, так как на всем интервале 1–3 мин нет участков, на которых скорость была бы равна нулю. Вариант 2 тоже неверный, так как максимальная скорость на интервале 1–3 составляет 60 км/ч. Этот факт соответствует варианту 3 – скорость составляла 60 км/ч на всем интервале.

Правильный ответ: 3.

(3 балла)

Вопрос 6

Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.

А	Б	В	Г
			

Характеристики функций:

1. Функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$.
2. Функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$.
3. Функция убывает на отрезке $[-1; 1]$.
4. Функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$.

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	Б	В	Г

Решение

Точка максимума – это такая внутренняя точка графика, где значение функции в больше, чем во всех достаточно близких к ней точках. На графике она выглядит как локальный «холмик». Следовательно, характеристике «функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой А.

Точка минимума – такая внутренняя точка графика, где значение функции меньше, чем во всех достаточно близких к ней точках. На графике она выглядит как локальная «ямка». Следовательно, характеристике «функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой Б.

Функция $y = f(x)$ убывает на множестве M , если для любых x_1 и x_2 , принадлежащих множеству M , из неравенства $x_2 > x_1$ следует неравенство $f(x_2) < f(x_1)$. Следовательно, характеристике «функция убывает на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой Г.

Функция $y = f(x)$ возрастает на множестве M , если для любых x_1 и x_2 , принадлежащих множеству M , из неравенства $x_2 > x_1$ следует неравенство $f(x_2) > f(x_1)$. Следовательно, характеристике «функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой В.

Правильный ответ:

А	Б	В	Г
1	2	4	3

(6 баллов)

Вопрос 7

Найдите значение выражения: $\frac{10 \sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ}{\sin 240^\circ}$.

Решение

Воспользуемся тригонометрической формулой двойного угла:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha .$$

Числитель выражения в соответствии с формулой двойного угла преобразуется следующим образом:

$$10\sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ = 5 \cdot 2 \cdot \sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ = 5 \cdot \sin(2 \cdot 120^\circ) = 5 \sin 240^\circ.$$

Подставим полученное выражение в исходное вместо числителя, в итоге получим:

$$\frac{10\sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ}{\sin 240^\circ} = \frac{5 \sin 240^\circ}{\sin 240^\circ} = 5.$$

Правильный ответ: 5.

(3 балла)

Вопрос 8

Решите уравнение: $x^2 - 3x + 2 = 0$.

Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них.

Решение

Если в квадратном уравнении вида $ax^2 + bx + c = 0$ коэффициент $a = 1$, то можно воспользоваться теоремой Виета. Согласно данной теореме, произведение корней равно свободному члену c , а сумма корней коэффициенту b , взятому с противоположным знаком. То есть $x_1 \cdot x_2 = c$, $x_1 + x_2 = -b$. Зададимся вопросом: произведение каких двух чисел равно 2? Очевидно, что это числа 1 и 2. Сумма этих чисел равна 3, то есть коэффициенту b , взятому с противоположным знаком. Получили: $x_1 = 1$, $x_2 = 2$. В задаче требуется в качестве ответа указать больший корень. Больший корень = 2.

Правильный ответ: 2.

(4 балла)

Вопрос 9

Решите систему уравнений:
$$\begin{cases} 10x + 2y = 12, \\ -15x + y = -10. \end{cases}$$

Укажите в ответе, чему равен y .

Решение

Распишем решение по шагам.

Первый шаг. Выразим из второго уравнения системы y .

$$y = -10 + 15x$$

Второй шаг. Подставим полученное выражение в первое уравнение вместо y и найдем x .

$$10x + 2(-10 + 15x) = 12$$

$$10x - 20 + 30x = 12$$

$$40x = 12 + 20$$

$$40x = 32$$

$$x = \frac{32}{40} = \frac{4}{5}$$

Третий шаг. Подставим найденное значение x в выражение для y , полученное на первом шаге, и найдем y .

$$y = -10 + 15 \cdot \frac{4}{5} = -10 + 3 \cdot 4 = -10 + 12 = 2.$$

В задаче требуется в качестве ответа указать, чему равен y . Получили $y = 2$.

Правильный ответ: 2.

(4 балла)

Вопрос 10

Решите неравенство: $5x - 3(2x + 1) > 10$.

- a) $x > 4$
- b) $x < -13$
- c) $x < 2$
- d) $x > 2$

Решение

Чтобы решить неравенство, сначала нужно решить соответствующее уравнение:

$$5x - 3(2x + 1) = 10$$

$$5x - 6x - 3 = 10$$

$$-x = 13. \text{ Откуда } x = -13.$$

Данный корень является точкой смены знака в неравенстве. Возьмем точку, расположенную на числовой оси левее точки $x = -13$. Одной из таких точек будет точка $x = -15$. Подставим $x = -15$ в исходное неравенство и проверим знак.

$$5 \cdot (-15) - 3(2 \cdot (-15) + 1) > 10$$

$$-75 - 3 \cdot (-29) > 10$$

$$12 > 10$$

Видно, что неравенство выполняется. Следовательно, решение неравенства будет на числовой оси левее точки $x = -13$, то есть при $x < -13$.

Правильный ответ: $x < -13$.

(4 балла)

Вопрос 11

Найдите производную функции: $f(x) = x^5 + 2x^3 - 10x^2 + 10$. В ответ запишите значение производной в точке $x = 2$.

Решение

Для нахождения производной воспользуемся таблицей производных.

Найдем в таблице производную степенной функции: $(x^n)' = nx^{n-1}$. Учтем, что производная константы равна нулю, а производная алгебраической суммы нескольких функций равна алгебраической сумме производных этих функций, то есть $(U + V)' = U' + V'$.

Следовательно, производная функции $f(x)$ равна:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^5)' + 2(x^3)' - 10(x^2)' + (10)' = 5x^{5-1} + 2 \cdot 3x^{3-1} - 10 \cdot 2x^{2-1} + 0 = \\ &= 5x^4 + 6x^2 - 20x. \end{aligned}$$

Вычислим значение производной функции в точке $x = 2$. Для этого подставим в полученную производную $x = 2$:


$$f'(2) = 5 \cdot 2^4 + 6 \cdot 2^2 - 20 \cdot 2 = 5 \cdot 16 + 6 \cdot 4 - 40 = 80 + 24 - 40 = 64.$$

Правильный ответ: 64.

(6 баллов)

Вопрос 12

Даны два шара радиусами 12 и 2. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего?



Решение

Применим формулу для нахождения площади поверхности шара: $S = 4\pi R^2$. Обозначим площадь поверхности большего шара и его радиус как S_2 и R_2 , площадь

поверхности меньшего шара и его радиус – S_1 и R_1 . Запишем отношение площади большего шара к площади меньшего шара, подставив в формулу радиусы шаров:

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{4\pi R_2^2}{4\pi R_1^2} = \frac{R_2^2}{R_1^2} = \frac{12^2}{2^2} = \frac{144}{4} = 36.$$

Получили, что площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего шара в 36 раз.

Правильный ответ: 36.

(4 балла)


Вопрос 13

В треугольнике ABC угол A равен 90° , $\operatorname{ctg} B = \sqrt{3}$, $AC = 20$. Найдите BC .

Ответ запишите в виде целого числа или конечной десятичной дроби, округлив до двух знаков после запятой.

Решение

Для наглядности построим прямоугольный треугольник:



Известно, что катет прямоугольного треугольника равен произведению гипотенузы на синус противолежащего ему угла. Длина катета AC известна по условию задачи, также известен тангенс противолежащего этому катета угла B . Следовательно, найдя угол B , мы сможем вычислить гипотенузу. По условию задачи, $\operatorname{ctg} B = \sqrt{3}$, значит, угол $B = \operatorname{arccotg}(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{6}$. Запишем выражение в соответствии

с тем, что катет прямоугольного треугольника равен произведению гипотенузы на синус противолежащего ему угла: $AC = BC \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

Известно, что $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$, а катет $AC = 20$ по условию задачи. Получаем:

$$20 = BC \cdot \frac{1}{2}. \text{ Из данного выражения находим } BC: BC = 40.$$

Правильный ответ: 40.

(8 баллов)

Вопрос 14

Решите уравнение: $8 \cdot 2^{x^2+8} = 2^{-6x+3}$. Если уравнение имеет более одного корня, то в ответе запишите сумму всех его корней.

Решение

Легко заметить, что число 8 можно представить следующим образом:

$$8 = 2^3.$$

С учетом этого факта перепишем уравнение в следующем виде:

$$2^3 \cdot 2^{x^2+8} = 2^{-6x+3}.$$

Известно, что при умножении степеней с одинаковыми основаниями основание оставляем без изменений, а показатели степеней складываем. Соответственно, выражение принимает вид:

$$2^{3+x^2+8} = 2^{-6x+3}.$$

Чтобы найти неизвестное x , необходимо приравнять степени:

$$3 + x^2 + 8 = -6x + 3.$$

Перенесем все члены уравнения в левую часть:

$$3 + x^2 + 8 + 6x - 3 = 0$$

и получим квадратное уравнение: $x^2 + 6x + 8 = 0$.

Так как коэффициент при $x^2 = 1$, то найдем корни уравнения по теореме Виета. Согласно данной теореме, $x_1 \cdot x_2 = 8$, $x_1 + x_2 = -6$.

Получаем: $x_1 = -2$, $x_2 = -4$.

По условию задачи, в ответ необходимо записать сумму корней:

$$-2 - 4 = -6.$$

Правильный ответ: -6 .

(8 баллов)

Вопрос 15

Найдите $10\cos(2\pi - \beta) + 17\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)$, если $\cos\beta = \frac{2}{9}$.

Ответ запишите в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

Решение

Для решения данной задачи воспользуемся тригонометрическими формулами:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta + \sin\alpha \cdot \sin\beta,$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta - \cos\alpha \cdot \sin\beta.$$

Запишем $\cos(2\pi - \beta)$ в соответствии с формулой косинуса разности углов:

$$\cos(2\pi - \beta) = \cos 2\pi \cdot \cos\beta + \sin 2\pi \cdot \sin\beta.$$

Известно, что $\cos 2\pi = 1$, $\sin 2\pi = 0$. Также по условию задачи задано:

$$\cos\beta = \frac{2}{9}.$$

В соответствии с этим перепишем выражение:

$$\cos(2\pi - \beta) = \cos 2\pi \cdot \cos\beta + \sin 2\pi \cdot \sin\beta = 1 \cdot \frac{2}{9} + 0 \cdot \sin\beta = \frac{2}{9}.$$

Запишем $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)$ в соответствии с формулой синуса разности углов:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \cos\beta - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin\beta.$$

Известно, что $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)=1$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$. Также по условию задачи задано:

$$\cos\beta = \frac{2}{9}.$$

В соответствии с этим перепишем выражение:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\beta\right) = 1 \cdot \frac{2}{9} - 0 \cdot \sin\beta = \frac{2}{9}.$$

Подставим полученные значения в исходное выражение и получим окончательный ответ:

$$10\cos(2\pi-\beta) + 17\sin\left(\frac{\pi}{2}-\beta\right) = 10 \cdot \frac{2}{9} + 17 \cdot \frac{2}{9} = \frac{20}{9} + \frac{34}{9} = \frac{54}{9} = 6.$$

Правильный ответ: 6.

(12 баллов)

Вопрос 16

Найдите все значения a , при которых уравнение $(a-2)x^2 + 2(a-2)x + 2 = 0$ не имеет действительных корней.

a) $a \in [2; 4)$

b) $a \in (2; 4)$

c) $a \in [2; 4]$

d) $a = 1$

e) $a = 2$

f) $a > \frac{11}{9}$

g) $a \in [3; 3.75]$

h) $a > 6$

i) $a = -12$

Решение

Имеем дело с квадратным уравнением, однако в случае, когда коэффициент при x^2 равен нулю, уравнение станет линейным. Рассмотрим два случая: 1) уравнение линейное и 2) уравнение квадратное.

1. Уравнение будет линейным, если $(a - 2) = 0$, то есть $a = 2$. При данном значении параметра a уравнение примет вид: $2 = 0$. Оно не имеет действительных корней. Один из ответов на поставленный в задаче вопрос найден.

2. Уравнение будет квадратным, если $a \neq 2$. Оно не имеет действительных корней тогда и только тогда, когда его дискриминант отрицателен. Найдем дискриминант:

$$D = b^2 - 4ac = 4(a - 2)^2 - 8(a - 2) < 0.$$

$$(a - 2)(a - 4) < 0.$$

Решение данного неравенства: $a \in (2; 4)$.

С учетом пункта 1 получаем ответ: $a \in [2; 4)$.

Правильный ответ: $a \in [2; 4)$.

(13 баллов)

Вопрос 17

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $\sqrt{x + 2a - 1} + \sqrt{x - a} = 1$ имеет хотя бы один корень.

a) $0 \leq a \leq \frac{2}{3}$

b) $a \in (2; 4)$

c) $a \in [2; 4)$

d) $a = 1$

e) $a = 2$

f) $a < \frac{2}{3}$

g) $a \in \left[-\frac{2}{3}; 0\right]$

h) $a > 6$

i) $a = -12$

Решение

Сделаем замену переменных: $\sqrt{x+2a-1} = t$, $\sqrt{x-a} = z$, где $t \geq 0$ и $z \geq 0$.

Тогда $x+2a-1 = t^2$, $x-a = z^2$.

Выразим из обоих уравнений x и приравняем:

$$x = t^2 + 1 - 2a$$

$$x = z^2 + a$$

$$t^2 + 1 - 2a = z^2 + a$$

Исходное уравнение с учетом замены получилось таким: $t + z = 1$.

Получаем систему уравнений:
$$\begin{cases} t + z = 1, \\ t^2 + 1 - 3a = z^2. \end{cases}$$

Эта система должна иметь хотя бы одно решение, такое, что $t \geq 0$, $z \geq 0$.

Из первого уравнения найдем z : $t = 1 - z \Rightarrow 1 - z \geq 0 \Rightarrow z \leq 1$. Аналогично $t \leq 1$.

Второе уравнение:

$$t^2 - z^2 = 3a - 1$$

$$(t - z)(t + z) = 3a - 1$$

Получим систему:
$$\begin{cases} t + z = 1, \\ (t - z)(t + z) = 3a - 1. \end{cases}$$

Найдем сумму и разность уравнений системы и получим:
$$\begin{cases} t = \frac{3}{2}a, \\ z = \frac{2-3a}{2}. \end{cases}$$

Нужно найти, при каких значениях параметра a система имеет хотя бы одно решение: $0 \leq t \leq 1, 0 \leq z \leq 1$.

Запишем условия для параметра:
$$\begin{cases} 0 \leq 3a \leq 2, \\ 0 \leq \frac{2-3a}{2} \leq 1. \end{cases}$$

Найдем решения обоих неравенств. Оба неравенства дают решение:

$$0 \leq a \leq \frac{2}{3}.$$

При этом $0 \leq t \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ исходное уравнение имеет хотя бы одно решение.

Правильный ответ: $0 \leq a \leq \frac{2}{3}$.

(13 баллов)

Вариант 4
(с решениями)

Вопрос 1

Найдите наибольший общий делитель натуральных чисел: 216 и 18.

Решение

Разобьем решение на несколько шагов.

Первый шаг: найдем наибольший общий делитель чисел с помощью разложения на простые множители. Для этого каждое число будем делить на простой множитель до того момента, пока остаток не станет равен 1. Оформим деление в столбик.

Число	Делители	Число	Делители
216	2	18	2
108	2	9	3
54	2	3	3
27	3	1	
9	3		
3	3		
1			

Запишем разложение на простые множители в строчку:

$$216 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$$

$$18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$$

Второй шаг: подчеркнем общие простые множители:

$$216 = \underline{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot \underline{3} \cdot \underline{3} \cdot 3$$

$$18 = \underline{2} \cdot \underline{3} \cdot \underline{3}$$

Третий шаг: найдем произведение подчеркнутых простых множителей одного числа. Оно и будет являться наибольшим общим делителем двух чисел.

$$2 \cdot 3 \cdot 3 = 18 \text{ – наибольший общий делитель чисел 216 и 18.}$$

Правильный ответ: 18.

(3 балла)

Вопрос 2

Найдите значение выражения: $\left(\frac{1}{3} + \frac{7}{6}\right) \div \frac{1}{6}$.

Решение

Выражение, записанное в скобках, приведем к общему знаменателю, а деление на $\frac{1}{6}$ заменим умножением на число 6. Выполнив элементарные преобразования, получаем:

$$\left(\frac{1 \cdot 2 + 1 \cdot 7}{6}\right) \cdot 6 = \frac{9}{6} \cdot 6 = 9.$$

Правильный ответ: 9.

(3 балла)

Вопрос 3

Найдите значение выражения: $(2\sqrt{15} + 6) \cdot (2\sqrt{15} - 6)$.

Решение

Для нахождения значения данного выражения необходимо воспользоваться формулами сокращенного умножения. Разность квадратов определяется следующим образом: $a^2 - b^2 = (a - b) \cdot (a + b)$. В нашем случае $a = 2\sqrt{15}$, $b = 6$. Подставив данные значения в формулу, получаем:

$$(2\sqrt{15} + 6) \cdot (2\sqrt{15} - 6) = (2\sqrt{15})^2 - 6^2 = 2^2 \cdot 15 - 36 = 60 - 36 = 24.$$

Правильный ответ: 24.

(3 балла)

Вопрос 4

Пицца стоит 640 руб. Именинникам пиццерия делает скидку 10%. Сколько рублей стоит пицца для именинника?

Решение

Найдем размер скидки в рублях, зная процент скидки и стоимость пиццы:

$$640 \cdot 0,10 = 64 \text{ руб.}$$

Следовательно, для именинника пицца стоит:


$$640 - 64 = 576 \text{ руб.}$$

Правильный ответ: 576.

(3 балла)

Вопрос 5

На графике изображена зависимость скорости движения рейсового автобуса от времени. На вертикальной оси отмечена скорость автобуса (км/ч), на горизонтальной – время (мин), прошедшее с начала движения автобуса.



Пользуясь графиком, укажите характеристику скорости движения рейсового автобуса для интервала времени 13–14 мин.

1. Скорость составляла 100 км/ч на всем интервале.
2. Скорость не меньше 20 км/ч на всем интервале.
3. Скорость не больше 60 км/ч.
4. Была остановка длительностью ровно 1 мин.

Решение


Проанализируем варианты ответа и посмотрим на график в интервале 13–14 мин. Из графика видно, что на всем данном интервале скорость равна 100 км/ч. Данный факт соответствует варианту 1 – скорость автобуса составляла 100 км/ч на всем интервале.

Правильный ответ: 1.

(3 балла)

Вопрос 6

Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.



Характеристики функций:

1. Функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$.
2. Функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$.
3. Функция убывает на отрезке $[-1; 1]$.
4. Функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$.

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	Б	В	Г

Решение

Точка максимума – это такая внутренняя точка графика, где значение функции больше, чем во всех достаточно близких к ней точках. На графике она

выглядит как локальный «холмик». Следовательно, характеристике «функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой Г.

Точка минимума – такая внутренняя точка графика, где значение функции меньше, чем во всех достаточно близких к ней точках. На графике она выглядит как локальная «ямка». Следовательно, характеристике «функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой В.

Функция $y = f(x)$ убывает на множестве M , если для любых x_1 и x_2 , принадлежащих множеству M , из неравенства $x_2 > x_1$ следует неравенство $f(x_2) < f(x_1)$. Следовательно, характеристике «функция убывает на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой А.

Функция $y = f(x)$ возрастает на множестве M , если для любых x_1 и x_2 , принадлежащих множеству M , из неравенства $x_2 > x_1$ следует неравенство $f(x_2) > f(x_1)$. Следовательно, характеристике «функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой Б.

Правильный ответ:

А	Б	В	Г
3	4	2	1

(6 баллов)

Вопрос 7

Найдите значение выражения: $\frac{12 \sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ}{\sin 240^\circ}$.

Решение

Воспользуемся тригонометрической формулой двойного угла:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha .$$

Числитель выражения в соответствии с формулой двойного угла преобразуется следующим образом:

$$12 \sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ = 6 \cdot 2 \cdot \sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ = 6 \cdot \sin(2 \cdot 120^\circ) = 6 \sin 240^\circ .$$

Подставим полученное выражение в исходное вместо числителя, в итоге получим:

$$\frac{12 \sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ}{\sin 240^\circ} = \frac{6 \sin 240^\circ}{\sin 240^\circ} = 6.$$

Правильный ответ: 6.

(3 балла)

Вопрос 8

Решите уравнение: $x^2 + 4x + 3 = 0$.

Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них.

Решение

Если в квадратном уравнении вида $ax^2 + bx + c = 0$ коэффициент $a = 1$, то можно воспользоваться теоремой Виета. Согласно данной теореме, произведение корней равно свободному члену c , а сумма корней коэффициенту b , взятому с противоположным знаком. То есть $x_1 \cdot x_2 = c$, $x_1 + x_2 = -b$. Зададимся вопросом: произведение каких двух чисел равно 3? Очевидно, что это числа 1 и 3. Сумма этих чисел равна 4. По теореме Виета, сумма корней должны быть равна коэффициенту b , взятому с противоположным знаком. Коэффициент $b = 4$. Сумма корней должна быть равна -4 . Значит, корни уравнения будут такими: $x_1 = -1$, $x_2 = -3$. В задаче требуется в качестве ответа указать больший корень. Больший корень = -1 .

Правильный ответ: -1 .

(4 балла)

Вопрос 9

Решите систему уравнений:
$$\begin{cases} 10x + 2y = 240, \\ -15x + y = -100. \end{cases}$$

Укажите в ответе, чему равен y .

Решение

Распишем решение по шагам.

Первый шаг. Выразим из второго уравнения системы y .

$$y = -100 + 15x$$

Второй шаг. Подставим полученное выражение в первое уравнение вместо y и найдем x .

$$10x + 2(-100 + 15x) = 240$$

$$10x - 200 + 30x = 240$$

$$40x = 240 + 200$$

$$40x = 440$$

$$x = 11$$

Третий шаг. Подставим найденное значение x в выражение для y , полученное на первом шаге, и найдем y .

$$y = -100 + 15 \cdot 11 = -100 + 165 = 65.$$

В задаче требуется в качестве ответа указать, чему равен y . Получили $y = 65$.

Правильный ответ: 65.

(4 балла)

Вопрос 10

Решите неравенство: $3x + 4(8x + 10) < 75$.

a) $x > 4$

b) $x > 2$

c) $x < 1$

d) $x > 1$

Решение

Чтобы решить неравенство, сначала нужно решить соответствующее уравнение:

$$3x + 4(8x + 10) = 75$$

$$3x + 32x + 40 = 75$$

$$35x = 35. \text{ Откуда } x = 1.$$

Данный корень является точкой смена знака в неравенстве. Возьмем точку, расположенную на числовой оси левее точки $x = 1$. Одной из таких точек будет точка $x = 0$. Подставим $x = 0$ в исходное неравенство и проверим знак.

$$3 \cdot 0 + 4(8 \cdot 0 + 10) < 75$$

$$0 + 4(0 + 10) < 75$$

$$40 < 75$$

Видно, что неравенство выполняется. Следовательно, решение неравенства будет на числовой оси левее точки $x = 1$, то есть при $x < 1$.

Правильный ответ: $x < 1$.

(4 балла)

Вопрос 11

Найдите производную функции: $f(x) = 10x^8 - 6x^6 + 5x^4 - 3x$. В ответ запишите значение производной в точке $x = 1$.

Решение

Для нахождения производной воспользуемся таблицей производных.

Найдем в таблице производную степенной функции: $(x^n)' = nx^{n-1}$. Учтем, что производная константы равна нулю, а производная алгебраической суммы нескольких функций равна алгебраической сумме производных этих функций, то есть $(U + V)' = U' + V'$.

Следовательно, производная функции $f(x)$ равна:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 10(x^8)' - 6(x^6)' + 5(x^4)' - 3(x)' = 10 \cdot 8x^{8-1} - 6 \cdot 6x^{6-1} + 5 \cdot 4x^{4-1} - 3 \cdot 1 = \\ &= 80x^7 - 36x^5 + 20x^3 - 3. \end{aligned}$$

Вычислим значение производной функции в точке $x = 1$. Для этого подставим в полученную производную $x = 1$:


$$f'(1) = 80 \cdot 1^7 - 36 \cdot 1^5 + 20 \cdot 1^3 - 3 = 80 - 36 + 20 - 3 = 61.$$

Правильный ответ: 61.

(6 баллов)

Вопрос 12

Даны два шара радиусами 16 и 4. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего?



Решение

Применим формулу для нахождения площади поверхности шара: $S = 4\pi R^2$. Обозначим площадь поверхности большего шара и его радиус как S_2 и R_2 , площадь поверхности меньшего шара и его радиус – S_1 и R_1 . Запишем отношение площади большего шара к площади меньшего шара, подставив в формулу радиусы шаров:

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{4\pi R_2^2}{4\pi R_1^2} = \frac{R_2^2}{R_1^2} = \frac{16^2}{4^2} = \frac{256}{16} = 16.$$

Получили, что площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего шара в 16 раз.

Правильный ответ: 16.

(4 балла)


Вопрос 13

В треугольнике ABC угол A равен 90° , $\operatorname{tg}B = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $AC = 12$. Найдите BC .

Ответ запишите в виде целого числа или конечной десятичной дроби, округлив до двух знаков после запятой.

Решение

Для наглядности построим прямоугольный треугольник:



Известно, что катет прямоугольного треугольника равен произведению гипотенузы на синус противолежащего ему угла. Длина катета AC известна по условию задачи, также известен тангенс противолежащего этому катету угла B . Следовательно, найдя угол B , мы сможем вычислить гипотенузу. По условию задачи,

$\operatorname{tg}B = \frac{\sqrt{3}}{3}$, значит, угол $B = \operatorname{arctg}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{\pi}{6}$. Запишем выражение в соответствии

с тем, что катет прямоугольного треугольника равен произведению гипотенузы на синус противолежащего ему угла: $AC = BC \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

Известно, что $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$, а катет $AC = 12$ по условию задачи. Получаем:

$12 = BC \cdot \frac{1}{2}$. Из данного выражения находим BC : $BC = 2 \cdot 12 = 24$.

Правильный ответ: 24.

(8 баллов)

Вопрос 14

Решите уравнение: $64 \cdot 4^{2x^2+4} = 4^{x^2-2x+15}$. Если уравнение имеет более одного корня, то в ответе запишите сумму всех его корней.

Решение

Легко заметить, что число 64 можно представить следующим образом:

$$64 = 4^3.$$

С учетом этого факта перепишем уравнение в следующем виде:

$$4^3 \cdot 4^{2x^2+4} = 4^{x^2-2x+15}.$$

Известно, что при умножении степеней с одинаковыми основаниями основание оставляем без изменений, а показатели степеней складываем. Соответственно, выражение принимает вид:

$$4^{3+2x^2+4} = 4^{x^2-2x+15}.$$

Чтобы найти неизвестное x , необходимо приравнять степени:

$$3 + 2x^2 + 4 = x^2 - 2x + 15.$$

Перенесем все члены уравнения в левую часть:

$$3 + 2x^2 + 4 - x^2 + 2x - 15 = 0$$

и получим квадратное уравнение: $x^2 + 2x - 8 = 0$.

Так как коэффициент при $x^2 = 1$, то найдем корни уравнения по теореме Виета. Согласно данной теореме, $x_1 \cdot x_2 = -8$, $x_1 + x_2 = -2$.

Получаем: $x_1 = 2$, $x_2 = -4$.

По условию задачи, в ответ необходимо записать сумму корней:

$$2 - 4 = -2.$$

Правильный ответ: -2 .

(8 баллов)

Вопрос 15

Найдите $6\cos(\pi - \beta) + 18\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)$, если $\cos\beta = \frac{1}{3}$.

Ответ запишите в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

Решение

Для решения данной задачи воспользуемся тригонометрическими формулами:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta + \sin\alpha \cdot \sin\beta,$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta - \cos\alpha \cdot \sin\beta.$$

Запишем $\cos(\pi - \beta)$ в соответствии с формулой косинуса разности углов:

$$\cos(\pi - \beta) = \cos\pi \cdot \cos\beta + \sin\pi \cdot \sin\beta.$$

Известно, что $\cos\pi = -1$, $\sin\pi = 0$. Также по условию задачи задано:

$$\cos\beta = \frac{1}{3}.$$

В соответствии с этим перепишем выражение:

$$\cos(\pi - \beta) = \cos\pi \cdot \cos\beta + \sin\pi \cdot \sin\beta = -1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \sin\beta = -\frac{1}{3}.$$

Запишем $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)$ в соответствии с формулой синуса разности углов:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \cos\beta - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin\beta.$$

Известно, что $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$.

Также по условию задачи задано:

$$\cos\beta = \frac{1}{3}.$$

В соответствии с этим перепишем выражение:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = 1 \cdot \frac{1}{3} - 0 \cdot \sin\beta = \frac{1}{3}.$$

Подставим полученные значения в исходное выражение и получим окончательный ответ:

$$6\cos(\pi - \beta) + 18\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = 6 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 18 \cdot \frac{1}{3} = -2 + 6 = 4.$$

Правильный ответ: 4.

(12 баллов)

Вопрос 16

Найдите все значения a , при которых уравнение $(a - 2)x^2 + 2(a - 2)x + 2 = 0$ не имеет действительных корней.

- a) $a \in [2; 4)$
- b) $a \in (2; 4)$
- c) $a \in [2; 4]$
- d) $a = 1$
- e) $a = 2$
- f) $a > \frac{11}{9}$
- g) $a \in [3; 3.75]$
- h) $a > 6$
- i) $a = -12$

Решение

Имеем дело с квадратным уравнением, однако в случае, когда коэффициент при x^2 равен нулю, уравнение станет линейным. Рассмотрим два случая: 1) уравнение линейное и 2) уравнение квадратное.

1. Уравнение будет линейным, если $(a - 2) = 0$, то есть $a = 2$. При данном значении параметра a уравнение примет вид: $2 = 0$. Оно не имеет действительных корней. Один из ответов на поставленный в задаче вопрос найден.

2. Уравнение будет квадратным, если $a \neq 2$. Оно не имеет действительных корней тогда и только тогда, когда его дискриминант отрицателен. Найдем дискриминант:

$$D = b^2 - 4ac = 4(a-2)^2 - 8(a-2) < 0.$$

$$(a-2)(a-4) < 0.$$

Решение данного неравенства: $a \in (2; 4)$.

С учетом пункта 1 получаем ответ: $a \in [2; 4)$.

Правильный ответ: $a \in [2; 4)$.

(13 баллов)

Вопрос 17

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $\sqrt{x+2a-1} + \sqrt{x-a} = 1$ имеет хотя бы один корень.

a) $0 \leq a \leq \frac{2}{3}$

b) $a \in (2; 4)$

c) $a \in [2; 4)$

d) $a = 1$

e) $a = 2$

f) $a < \frac{2}{3}$

g) $a \in \left[-\frac{2}{3}; 0\right]$

h) $a > 6$

i) $a = -12$

Решение

Сделаем замену переменных: $\sqrt{x+2a-1} = t$, $\sqrt{x-a} = z$, где $t \geq 0$ и $z \geq 0$.

Тогда $x+2a-1 = t^2$, $x-a = z^2$.

Выразим из обоих уравнений x и приравняем:

$$x = t^2 + 1 - 2a$$

$$x = z^2 + a$$

$$t^2 + 1 - 2a = z^2 + a$$

Исходное уравнение с учетом замены получилось таким: $t + z = 1$.

Получаем систему уравнений:
$$\begin{cases} t + z = 1, \\ t^2 + 1 - 3a = z^2. \end{cases}$$

Эта система должна иметь хотя бы одно решение, такое, что $t \geq 0$, $z \geq 0$.

Из первого уравнения найдем z : $t = 1 - z \Rightarrow 1 - z \geq 0 \Rightarrow z \leq 1$. Аналогично $t \leq 1$.

Второе уравнение:

$$t^2 - z^2 = 3a - 1$$

$$(t - z)(t + z) = 3a - 1$$

Получим систему:
$$\begin{cases} t + z = 1, \\ (t - z)(t + z) = 3a - 1. \end{cases}$$

Найдем сумму и разность уравнений системы и получим:
$$\begin{cases} t = \frac{3}{2}a, \\ z = \frac{2-3a}{2}. \end{cases}$$

Нужно найти, при каких значениях параметра a система имеет хотя бы одно решение: $0 \leq t \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$.

Запишем условия для параметра:
$$\begin{cases} 0 \leq 3a \leq 2, \\ 0 \leq \frac{2-3a}{2} \leq 1. \end{cases}$$

Найдем решения обоих неравенств. Оба неравенства дают решение:

$$0 \leq a \leq \frac{2}{3}.$$

При этом $0 \leq t \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ исходное уравнение имеет хотя бы одно решение.

Правильный ответ: $0 \leq a \leq \frac{2}{3}$.

(13 баллов)

Вариант 5
(с решениями)

Вопрос 1

Найдите наибольший общий делитель натуральных чисел: 200 и 45.

Решение

Разобьем решение на несколько шагов.

Первый шаг: найдем наибольший общий делитель чисел с помощью разложения на простые множители. Для этого каждое число будем делить на простой множитель до того момента, пока остаток не станет равен 1. Оформим деление в столбик.

Число	Делители	Число	Делители
200	2	45	5
100	2	9	3
50	2	3	3
25	5	1	
5	5		
1			

Запишем разложение на простые множители в строчку:

$$200 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5$$

$$45 = 5 \cdot 3 \cdot 3$$

Второй шаг: подчеркнем общие простые множители:

$$200 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \underline{5} \cdot 5$$

$$45 = \underline{5} \cdot 3 \cdot 3$$

Третий шаг: найдем произведение подчеркнутых простых множителей одного числа. Оно и будет являться наибольшим общим делителем двух чисел.

5 – наибольший общий делитель чисел 200 и 45.

Правильный ответ: 5.

(3 балла)

Вопрос 2

Найдите значение выражения: $\left(\frac{1}{3} + \frac{7}{6}\right) \div \frac{9}{6}$.

Решение

Выражение, записанное в скобках, приведем к общему знаменателю, а деление на $\frac{9}{6}$ заменим умножением на число $\frac{6}{9}$. Выполнив элементарные преобразования, получаем:

$$\left(\frac{1 \cdot 2 + 1 \cdot 7}{6}\right) \cdot \frac{6}{9} = \frac{9}{6} \cdot \frac{6}{9} = 1.$$

Правильный ответ: 1.

(3 балла)

Вопрос 3

Найдите значение выражения: $(4\sqrt{15} - 5) \cdot (4\sqrt{15} + 5)$.

Решение

Для нахождения значения данного выражения необходимо воспользоваться формулами сокращенного умножения. Разность квадратов определяется следующим образом: $a^2 - b^2 = (a - b) \cdot (a + b)$. В нашем случае: $a = 4\sqrt{15}$, $b = 5$. Подставив данные значения в формулу, получаем:

$$(4\sqrt{15} - 5) \cdot (4\sqrt{15} + 5) = (4\sqrt{15})^2 - 5^2 = 4^2 \cdot 15 - 25 = 240 - 25 = 215.$$

Правильный ответ: 215.

(3 балла)

Вопрос 4

Пирог стоит 700 руб. Именинникам пекарня делает скидку 10%. Сколько рублей стоит пирог для именинника?

Решение


Найдем размер скидки в рублях, зная процент скидки и стоимость пирога:
 $700 \cdot 0,10 = 70$ руб. Следовательно, для именинника пирог стоит: $700 - 70 = 630$ руб.

Правильный ответ: 630.

(3 балла)

Вопрос 5

На графике изображена зависимость скорости движения рейсового автобуса от времени. На вертикальной оси отмечена скорость автобуса (км/ч), на горизонтальной – время (мин), прошедшее с начала движения автобуса.



Пользуясь графиком, укажите характеристику скорости движения рейсового автобуса для интервала времени 2–3 мин.

1. Была остановка длительностью 2 мин.
2. Скорость не больше 20 км/ч на всем интервале.
3. Скорость составляла 60 км/ч на всем интервале.
4. Была остановка длительностью 1 мин.

Решение


Проанализируем варианты ответа и посмотрим на график в интервале 2–3 мин. Варианты 1 и 4 неверные, так как на всем интервале 2–3 мин нет участков, на которых скорость была бы равна нулю. Вариант 2 тоже неверный, так как максимальная скорость на интервале 2–3 составляет 60 км/ч. Этот факт соответствует варианту 3 – скорость составляла 60 км/ч на всем интервале.

Правильный ответ: 3.

(3 балла)

Вопрос 6

Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.



Характеристики функций:

1. Функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$.
2. Функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$.
3. Функция убывает на отрезке $[-1; 1]$.
4. Функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$.

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	Б	В	Г

Решение

Точка максимума – это такая внутренняя точка графика, что значение функции в ней больше, чем во всех достаточно близких к ней точках. На графике

выглядит как локальный «холмик». Следовательно, характеристике «функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой А.

Точка минимума – такая внутренняя точка графика, что значение функции в ней меньше, чем во всех достаточно близких к ней точках. На графике выглядит как локальная «ямка». Следовательно, характеристике «функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой Б.

Функция $y = f(x)$ убывает на множестве M , если для любых x_1 и x_2 , принадлежащих множеству M , из неравенства $x_2 > x_1$ следует неравенство $f(x_2) < f(x_1)$. Следовательно, характеристике «функция убывает на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой Г.

Функция $y = f(x)$ возрастает на множестве M , если для любых x_1 и x_2 , принадлежащих множеству M , из неравенства $x_2 > x_1$ следует неравенство $f(x_2) > f(x_1)$. Следовательно, характеристике «функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой В.

Правильный ответ:

А	Б	В	Г
1	2	4	3

(6 баллов)

Вопрос 7

Найдите значение выражения: $\frac{6 \sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ}{\sin 240^\circ}$.

Решение

Воспользуемся тригонометрической формулой двойного угла:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha.$$

Числитель выражения в соответствии с формулой двойного угла преобразуется следующим образом:

$$6 \sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ = 3 \cdot 2 \cdot \sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ = 3 \cdot \sin(2 \cdot 120^\circ) = 3 \sin 240^\circ.$$

Подставим полученное выражение в исходное вместо числителя, в итоге получим:

$$\frac{6 \sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ}{\sin 240^\circ} = \frac{3 \sin 240^\circ}{\sin 240^\circ} = 3.$$

Правильный ответ: 3.

(3 балла)

Вопрос 8

Решите уравнение: $x^2 - 7x + 12 = 0$.

Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них.

Решение

Если в квадратном уравнении вида: $ax^2 + bx + c = 0$ коэффициент $a = 1$, то можно воспользоваться теоремой Виета. Согласно данной теореме, произведение корней равно свободному члену c , а сумма корней коэффициенту b , взятому с противоположным знаком. То есть $x_1 \cdot x_2 = c$, $x_1 + x_2 = -b$. Зададимся вопросом: произведение каких двух чисел равно 12? Очевидно, что это числа 4 и 3. Сумма этих чисел равна 7. По теореме Виета, сумма корней должны быть равна коэффициенту b , взятому с противоположным знаком. Коэффициент $b = -7$. Сумма корней должна быть равна 7. Значит, корни уравнения будут такими: $x_1 = 3$, $x_2 = 4$. В задаче требуется в качестве ответа указать больший корень. Больший корень = 4.

Правильный ответ: 4.

(4 балла)

Вопрос 9

Решите систему уравнений:
$$\begin{cases} 10x + 2y = 240, \\ 3x + y = -140. \end{cases}$$

Укажите в ответе, чему равен y .

Решение

Распишем решение по шагам.

Первый шаг. Выразим из второго уравнения системы y .

$$y = -140 - 3x$$

Второй шаг. Подставим полученное выражение в первое уравнение вместо y и найдем x .

$$10x + 2(-140 - 3x) = 240$$

$$10x - 280 - 6x = 240$$

$$4x = 240 + 280$$

$$4x = 520$$

$$x = 130$$

Третий шаг. Подставим найденное значение x в выражение для y , полученное на первом шаге, и найдем y .

$$y = -140 - 3x = -140 - 3 \cdot 130 = -140 - 390 = -530.$$

В задаче требуется в качестве ответа указать, чему равен y . Получили $y = -530$.

Правильный ответ: -530 .

(4 балла)

Вопрос 10

Решите неравенство: $3x + 4(8x + 10) < 110$.

a) $x < 2$

b) $x > 2$

c) $x < 1$

d) $x > 1$

Решение

Чтобы решить неравенство, сначала нужно решить соответствующее уравнение:

$$3x + 4(8x + 10) = 110$$

$$3x + 32x + 40 = 110$$

$$35x = 70. \text{ Откуда } x = 2.$$

Данный корень является точкой смена знака в неравенстве. Возьмем точку, расположенную на числовой оси левее точки $x = 2$. Одной из таких точек будет точка $x = 0$. Подставим $x = 0$ в исходное неравенство и проверим знак.

$$3 \cdot 0 + 4(8 \cdot 0 + 10) < 110$$

$$0 + 4(0 + 10) < 110$$

$$40 < 110$$

Видно, что неравенство выполняется. Следовательно, решение неравенства будет на числовой оси левее точки $x = 2$, то есть при $x < 2$.

Правильный ответ: $x < 2$.

(4 балла)

Вопрос 11

Найдите производную функции: $f(x) = 5x^4 + 3x^3 - 4x^2 + 10$. В ответ запишите значение производной в точке $x = 1$.

Решение

Для нахождения производной воспользуемся таблицей производных.

Найдем в таблице производную степенной функции: $(x^n)' = nx^{n-1}$. Учтем, что производная константы равна нулю. А также то, что производная алгебраической суммы нескольких функций равна алгебраической сумме производных этих функций, то есть $(U + V)' = U' + V'$.

Следовательно, производная функции $f(x)$ равна:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 5(x^4)' + 3(x^3)' - 4(x^2)' + 10' = 5 \cdot 4x^{4-1} + 3 \cdot 3x^{3-1} - 4 \cdot 2x^{2-1} + 0 = \\ &= 20x^3 + 9x^2 - 8x. \end{aligned}$$

Вычислим значение производной функции в точке $x = 1$. Для этого подставим в полученную производную: $x = 1$.


$$f'(1) = 20 \cdot 1^3 + 9 \cdot 1^2 - 8 \cdot 1 = 20 + 9 - 8 = 21.$$

Правильный ответ: 21.

(6 баллов)

Вопрос 12

Даны два шара радиусами 10 и 2. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего?



Решение

Применим формулу для нахождения площади поверхности шара: $S = 4\pi R^2$. Обозначим площадь поверхности большего шара и его радиус – S_2 и R_2 , площадь поверхности меньшего шара и его радиус – S_1 и R_1 . Запишем отношение площади большего шара к площади меньшего шара, подставив в формулу радиусы шаров:

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{4\pi R_2^2}{4\pi R_1^2} = \frac{R_2^2}{R_1^2} = \frac{10^2}{2^2} = \frac{100}{4} = 25.$$

Получили, что площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего шара в 25 раз.

Правильный ответ: 25.

(4 балла)


Вопрос 13

В треугольнике ABC угол A равен 90° , $\operatorname{tg}B = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $AC = 30$. Найдите BC .

Ответ запишите в виде целого числа или конечной десятичной дроби, округлив до двух знаков после запятой.

Решение

Для наглядности построим прямоугольный треугольник:



Известно, что катет прямоугольного треугольника равен произведению гипотенузы на синус противолежащего ему угла. Длина катета AC известна по условию задачи, также известен тангенс противолежащего этому катету угла B . Следовательно, найдя угол B , мы сможем вычислить гипотенузу. По условию

задачи, $\operatorname{tg}B = \frac{\sqrt{3}}{3}$, значит, угол $B = \operatorname{arctg}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{\pi}{6}$. Запишем выражение в соот-

ветствии с тем, что катет прямоугольного треугольника равен произведению гипотенузы на синус противолежащего ему угла: $AC = BC \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

Известно, что $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$, а катет $AC = 30$ по условию задачи. Получаем:

$$30 = BC \cdot \frac{1}{2}. \text{ Из данного выражения находим } BC: BC = 2 \cdot 30 = 60.$$

Правильный ответ: 60.

(8 баллов)

Вопрос 14

Решите уравнение: $64 \cdot 4^{2x^2+4} = 4^{x^2+2x+15}$. Если уравнение имеет более одного корня, то в ответе запишите сумму всех его корней.

Решение

Легко заметить, что число 64 можно представить следующим образом: $64 = 4^3$. С учетом этого факта перепишем уравнение в следующем виде:

$$4^3 \cdot 4^{2x^2+4} = 4^{x^2+2x+15}.$$

Известно, что при умножении степеней с одинаковыми основаниями основание оставляем без изменений, а показатели степеней складываем. Соответственно, выражение принимает вид:

$$4^{3+2x^2+4} = 4^{x^2+2x+15}.$$

Чтобы найти неизвестное x , необходимо приравнять степени:

$$3 + 2x^2 + 4 = x^2 + 2x + 15.$$

Перенесем все члены уравнения в левую часть:

$$3 + 2x^2 + 4 - x^2 - 2x - 15 = 0$$

и получим квадратное уравнение:

$$x^2 - 2x - 8 = 0.$$

Так как коэффициент при $x^2 = 1$, то найдем корни уравнения по теореме Виета. Согласно данной теореме, $x_1 \cdot x_2 = -8$, $x_1 + x_2 = 2$.

Получаем: $x_1 = -2$, $x_2 = 4$.

По условию задачи, в ответ необходимо записать сумму корней:

$$4 + (-2) = 2.$$

Правильный ответ: 2.

(8 баллов)

Вопрос 15

Найдите $6 \cos(\pi - \beta) + 21 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)$, если $\cos \beta = \frac{1}{3}$.

Ответ запишите в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

Решение

Для решения данной задачи воспользуемся тригонометрическими формулами:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta,$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta.$$

Запишем $\cos(\pi - \beta)$ в соответствии с формулой косинуса разности углов:

$$\cos(\pi - \beta) = \cos \pi \cdot \cos \beta + \sin \pi \cdot \sin \beta.$$

Известно, что $\cos \pi = -1$, $\sin \pi = 0$. Также по условию задачи задано:

$$\cos \beta = \frac{1}{3}.$$

В соответствии с этим перепишем выражение:

$$\cos(\pi - \beta) = \cos \pi \cdot \cos \beta + \sin \pi \cdot \sin \beta = -1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \sin \beta = -\frac{1}{3}.$$

Запишем $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)$ в соответствии с формулой синуса разности углов:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \cos \beta - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin \beta.$$

Известно, что $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. Также по условию задачи задано:

$$\cos \beta = \frac{1}{3}.$$

В соответствии с этим перепишем выражение:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = 1 \cdot \frac{1}{3} - 0 \cdot \sin \beta = \frac{1}{3}.$$

Подставим полученные значения в исходное выражение и получим окончательный ответ:

$$6 \cos(\pi - \beta) + 21 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = 6 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 21 \cdot \frac{1}{3} = -2 + 7 = 5.$$

Правильный ответ: 5.

(12 баллов)

Вопрос 16

Найдите все значения a , при которых уравнение $(a-2)x^2 + 2(a-2)x + 2 = 0$ не имеет действительных корней.

а) $a \in [2; 4)$

б) $a \in (2; 4)$

в) $a \in [2; 4]$

г) $a = 1$

д) $a = 2$

е) $a > \frac{11}{9}$

ж) $a \in [3; 3.75]$

з) $a > 6$

е) $a = -12$

Решение

Имеем дело с квадратным уравнением, однако в случае, когда коэффициент при x^2 равен нулю, уравнение станет линейным. Рассмотрим два случая:

1) уравнение линейное и 2) уравнение квадратное.

1. Уравнение будет линейным, если $(a-2) = 0$, то есть $a = 2$. При данном значении параметра a уравнение примет вид: $2 = 0$. Оно не имеет действительных корней. Один из ответов на поставленный в задаче вопрос найден.

2. Уравнение будет квадратным, если $a \neq 2$. Оно не имеет действительных корней тогда и только тогда, когда его дискриминант отрицателен. Найдем дискриминант: $D = b^2 - 4ac = 4(a - 2)^2 - 8(a - 2) < 0$.

$$(a - 2)(a - 4) < 0.$$

Решение данного неравенства: $a \in (2; 4)$.

С учетом пункта 1 получаем ответ: $a \in [2; 4)$.

Правильный ответ: $a \in [2; 4)$.

(13 баллов)

Вопрос 17

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $\sqrt{x + 2a - 1} + \sqrt{x - a} = 1$ имеет хотя бы один корень.

а) $0 \leq a \leq \frac{2}{3}$

б) $a \in (2; 4)$

в) $a \in [2; 4)$

г) $a = 1$

д) $a = 2$

е) $a < \frac{2}{3}$

ж) $a \in \left[-\frac{2}{3}; 0\right]$

з) $a > 6$

е) $a = -12$

Решение

Сделаем замену переменных: $\sqrt{x + 2a - 1} = t$, $\sqrt{x - a} = z$, где $t \geq 0$ и $z \geq 0$.

Тогда $x + 2a - 1 = t^2$, $x - a = z^2$.

Выразим из обоих уравнений x и приравняем:

$$x = t^2 + 1 - 2a$$

$$x = z^2 + a$$

$$t^2 + 1 - 2a = z^2 + a$$

Исходное уравнение с учетом замены получилось таким: $t + z = 1$.

Получаем систему уравнений:
$$\begin{cases} t + z = 1, \\ t^2 + 1 - 3a = z^2. \end{cases}$$

Эта система должна иметь хотя бы одно решение – такое, что $t \geq 0$, $z \geq 0$.

Из первого уравнения найдем z : $t = 1 - z \Rightarrow 1 - z \geq 0 \Rightarrow z \leq 1$. Аналогично $t \leq 1$.

Второе уравнение:

$$t^2 - z^2 = 3a - 1$$

$$(t - z)(t + z) = 3a - 1$$

Получим систему:
$$\begin{cases} t + z = 1, \\ (t - z)(t + z) = 3a - 1. \end{cases}$$

Найдем сумму и разность уравнений системы и получим:
$$\begin{cases} t = \frac{3}{2}a, \\ z = \frac{2 - 3a}{2}. \end{cases}$$

Нужно найти, при каких значениях параметра a система имеет хотя бы одно решение: $0 \leq t \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$.

Запишем условия для параметра:
$$\begin{cases} 0 \leq 3a \leq 2, \\ 0 \leq \frac{2 - 3a}{2} \leq 1. \end{cases}$$

Найдем решения обоих неравенств. Оба неравенства дают решение:

$$0 \leq a \leq \frac{2}{3}.$$

При этом $0 \leq t \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ исходное уравнение имеет хотя бы одно решение.

Правильный ответ: $0 \leq a \leq \frac{2}{3}$.

(13 баллов)

Вариант 6
(с решениями)

Вопрос 1

Найдите наибольший общий делитель натуральных чисел: 200 и 50.

Решение

Разобьем решение на несколько шагов.

Первый шаг: найдем наибольший общий делитель чисел с помощью разложения на простые множители. Для этого каждое число будем делить на простой множитель до того момента, пока остаток не станет равен 1. Оформим деление в столбик.

Число	Делители	Число	Делители
200	2	50	2
100	2	25	5
50	2	5	5
25	5	1	
5	5		
1			

Запишем разложение на простые множители в строчку:

$$200 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5$$

$$50 = 2 \cdot 5 \cdot 5$$

Второй шаг: подчеркнем общие простые множители:

$$200 = \underline{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot \underline{5} \cdot \underline{5}$$

$$50 = \underline{2} \cdot \underline{5} \cdot \underline{5}$$

Третий шаг: найдем произведение подчеркнутых простых множителей одного числа. Оно и будет являться наибольшим общим делителем двух чисел.

$$2 \cdot 5 \cdot 5 = 50 \text{ – наибольший общий делитель чисел 200 и 50.}$$

Правильный ответ: 50.

(3 балла)

Вопрос 2

Найдите значение выражения: $\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) \div \frac{1}{6}$.

Решение

Выражение, записанное в скобках, приведем к общему знаменателю, а деление на $\frac{1}{6}$ заменим умножением на число 6. Выполнив элементарные преобразования, получаем:

$$\left(\frac{2 \cdot 2 + 1 \cdot 1}{6}\right) \cdot 6 = \frac{5}{6} \cdot 6 = 5.$$

Правильный ответ: 5.

(3 балла)

Вопрос 3

Найдите значение выражения: $(3\sqrt{15} - 1) \cdot (3\sqrt{15} + 1)$.

Решение

Для нахождения значения данного выражения необходимо воспользоваться формулами сокращенного умножения. Разность квадратов определяется следующим образом: $a^2 - b^2 = (a - b) \cdot (a + b)$. В нашем случае: $a = 3\sqrt{15}$, $b = 1$. Подставив данные значения в формулу, получаем:

$$(3\sqrt{15} - 1) \cdot (3\sqrt{15} + 1) = (3\sqrt{15})^2 - 1^2 = 3^2 \cdot 15 - 1 = 135 - 1 = 134.$$

Правильный ответ: 134.

(3 балла)

Вопрос 4

Пирог стоит 700 руб. Студентам пекарня делает скидку 5%. Сколько рублей стоит пирог для студента?

Решение


Найдем размер скидки в рублях, зная процент скидки и стоимость пирога:
 $700 \cdot 0,05 = 35$ руб. Следовательно, для студента пирог стоит: $700 - 35 = 665$ руб.

Правильный ответ: 665.

(3 балла)

Вопрос 5

На графике изображена зависимость скорости движения рейсового автобуса от времени. На вертикальной оси отмечена скорость автобуса (км/ч), на горизонтальной – время (мин), прошедшее с начала движения автобуса.



Пользуясь графиком, укажите характеристику скорости движения рейсового автобуса для интервала времени 13–15 мин.

1. Скорость составляла 100 км/ч на всем интервале.
2. Максимальная скорость составляла скорость 100 км/ч.
3. Скорость не больше 60 км/ч.
4. Была остановка длительностью 1 мин.

Решение

Проанализируем варианты ответа и посмотрим на график в интервале 13–15 мин. Из графика видно, что на данном интервале скорость была разная, но максимальная равна 100 км/ч. Данный факт соответствует варианту 2 – максимальная скорость автобуса составляла 100 км/ч на указанном интервале.

Правильный ответ: 2.

(3 балла)

Вопрос 6

Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.

А	Б	В	Г

Характеристики функций:

1. Функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$.
2. Функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$.
3. Функция убывает на отрезке $[-1; 1]$.
4. Функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$.

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	Б	В	Г

Решение

Точка максимума – это такая внутренняя точка графика, что значение функции в ней больше, чем во всех достаточно близких к ней точках. На графике

выглядит как локальный «холмик». Следовательно, характеристике «функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой Г.

Точка минимума – такая внутренняя точка графика, что значение функции в ней меньше, чем во всех достаточно близких к ней точках. На графике выглядит как локальная «ямка». Следовательно, характеристике «функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой В.

Функция $y = f(x)$ убывает на множестве M , если для любых x_1 и x_2 , принадлежащих множеству M , из неравенства $x_2 > x_1$ следует неравенство $f(x_2) < f(x_1)$. Следовательно, характеристике «функция убывает на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой А.

Функция $y = f(x)$ возрастает на множестве M , если для любых x_1 и x_2 , принадлежащих множеству M , из неравенства $x_2 > x_1$ следует неравенство $f(x_2) > f(x_1)$. Следовательно, характеристике «функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой Б.

Правильный ответ:

А	Б	В	Г
3	4	2	1

(6 баллов)

Вопрос 7

Найдите значение выражения: $\frac{20 \sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ}{\sin 240^\circ}$.

Решение

Воспользуемся тригонометрической формулой двойного угла:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha.$$

Числитель выражения в соответствии с формулой двойного угла преобразуется следующим образом:

$$20 \sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ = 10 \cdot 2 \cdot \sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ = 10 \cdot \sin(2 \cdot 120^\circ) = 10 \sin 240^\circ.$$

Подставим полученное выражение в исходное вместо числителя, в итоге получим:

$$\frac{20\sin 120^\circ \cdot \cos 120^\circ}{\sin 240^\circ} = \frac{10\sin 240^\circ}{\sin 240^\circ} = 10.$$

Правильный ответ: 10.

(3 балла)

Вопрос 8

Решите уравнение: $x^2 - x - 6 = 0$.

Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них.

Решение

Если в квадратном уравнении вида: $ax^2 + bx + c = 0$ коэффициент $a = 1$, то можно воспользоваться теоремой Виета. Согласно данной теореме, произведение корней равно свободному члену c , а сумма корней коэффициенту b , взятому с противоположным знаком. То есть $x_1 \cdot x_2 = c$, $x_1 + x_2 = -b$. Зададимся вопросом: произведение каких двух чисел равно -6 ? Очевидно, что это числа 2 и -3 или -2 и 3. По теореме Виета, сумма корней должна быть равна коэффициенту b , взятому с противоположным знаком. Коэффициент $b = -1$. Следовательно, сумма корней должна быть равна 1. Значит, корни уравнения будут такими: $x_1 = -2$, $x_2 = 3$. В задаче требуется в качестве ответа указать больший корень. Больший корень = 3.

Правильный ответ: 3.

(4 балла)

Вопрос 9

Решите систему уравнений:
$$\begin{cases} 10x + 2y = 240, \\ 3x + y = 140. \end{cases}$$

Укажите в ответе, чему равен y .

Решение

Распишем решение по шагам.

Первый шаг. Выразим из второго уравнения системы y .

$$y = 140 - 3x$$

Второй шаг. Подставим полученное выражение в первое уравнение вместо y и найдем x .

$$10x + 2(140 - 3x) = 240$$

$$10x + 280 - 6x = 240$$

$$4x = 240 - 280$$

$$4x = -40$$

$$x = -10$$

Третий шаг. Подставим найденное значение x в выражение для y , полученное на первом шаге, и найдем y .

$$y = 140 - 3x = 140 - 3 \cdot (-10) = 140 + 30 = 170.$$

В задаче требуется в качестве ответа указать, чему равен y . Получили $y = 170$.

Правильный ответ: 170.

(4 балла)

Вопрос 10

Решите неравенство: $3x + 4(8x + 10) < 145$.

a) $x > 3$

b) $x > 2$

c) $x < 3$

d) $x > 1$

Решение

Чтобы решить неравенство, сначала нужно решить соответствующее уравнение:

$$3x + 4(8x + 10) = 145$$

$$3x + 32x + 40 = 145$$

$$35x = 105. \text{ Откуда } x = 3.$$

Данный корень является точкой смена знака в неравенстве. Возьмем точку, расположенную на числовой оси левее точки $x = 3$. Одной из таких точек будет точка $x = 0$. Подставим $x = 0$ в исходное неравенство и проверим знак.

$$3 \cdot 0 + 4(8 \cdot 0 + 10) < 145$$

$$0 + 4(0 + 10) < 145$$

$$40 < 145$$

Видно, что неравенство выполняется. Следовательно, решение неравенства будет на числовой оси левее точки $x = 3$, то есть при $x < 3$.

Правильный ответ: $x < 3$.

(4 балла)

Вопрос 11

Найдите производную функции: $f(x) = 10x^5 - 6x^3 + 5x^2 - 3x$. В ответ запишите значение производной в точке $x = 1$.

Решение

Для нахождения производной воспользуемся таблицей производных.

Найдем в таблице производную степенной функции: $(x^n)' = nx^{n-1}$. Учтем, что производная константы равна нулю. А также то, что производная алгебраической суммы нескольких функций равна алгебраической сумме производных этих функций, то есть $(U + V)' = U' + V'$.

Следовательно, производная функции $f(x)$ равна:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 10(x^5)' - 6(x^3)' + 5(x^2)' - 3(x)' = 10 \cdot 5x^{5-1} - 6 \cdot 3x^{3-1} + 5 \cdot 2x^{2-1} - 3 \cdot 1 = \\ &= 50x^4 - 18x^2 + 10x - 3. \end{aligned}$$

Вычислим значение производной функции в точке $x = 1$. Для этого подставим в полученную производную: $x = 1$.


$$f'(1) = 50 \cdot 1^4 - 18 \cdot 1^2 + 10 \cdot 1 - 3 = 50 - 18 + 10 - 3 = 39.$$

Правильный ответ: 39.

(6 баллов)

Вопрос 12

Даны два шара радиусами 10 и 5. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего?



Решение

Применим формулу для нахождения площади поверхности шара: $S = 4\pi R^2$. Обозначим площадь поверхности большего шара и его радиус – S_2 и R_2 , площадь поверхности меньшего шара и его радиус – S_1 и R_1 . Запишем отношение площади большего шара к площади меньшего шара, подставив в формулу радиусы шаров:

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{4\pi R_2^2}{4\pi R_1^2} = \frac{R_2^2}{R_1^2} = \frac{10^2}{5^2} = \frac{100}{25} = 4.$$

Получили, что площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего шара в 4 раза.

Правильный ответ: 4.

(4 балла)


Вопрос 13

В треугольнике ABC угол A равен 90° , $\operatorname{ctg}B = \sqrt{3}$, $AC = 4$. Найдите BC .

Ответ запишите в виде целого числа или конечной десятичной дроби, округлив до двух знаков после запятой.

Решение

Для наглядности построим прямоугольный треугольник:



Известно, что катет прямоугольного треугольника равен произведению гипотенузы на синус противолежащего ему угла. Длина катета AC известна по условию задачи, также известен тангенс противолежащего этому катету угла B . Следовательно, найдя угол B , мы сможем вычислить гипотенузу. По условию задачи, $\operatorname{ctg}B = \sqrt{3}$, значит, угол $B = \operatorname{arccotg}(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{6}$. Запишем выражение в соответствии с тем, что катет прямоугольного треугольника равен произведению гипотенузы на синус противолежащего ему угла: $AC = BC \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

Известно, что $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$, а катет $AC = 4$ по условию задачи. Получаем:

$$4 = BC \cdot \frac{1}{2}. \text{ Из данного выражения находим } BC: BC = 8.$$

Правильный ответ: 8.

(8 баллов)

Вопрос 14

Решите уравнение: $27 \cdot 3^{2(x^2+4)} = 3^{x^2+5x+5}$. Если уравнение имеет более одного корня, то в ответе запишите сумму всех его корней.

Решение

Легко заметить, что число 27 можно представить следующим образом: $27 = 3^3$. С учетом этого факта перепишем уравнение в следующем виде:

$$3^3 \cdot 3^{2x^2+8} = 3^{x^2+5x+5}.$$

Известно, что при умножении степеней с одинаковыми основаниями основание оставляем без изменений, а показатели степеней складываем. Соответственно, выражение принимает вид:

$$3^{3+2x^2+8} = 3^{x^2+5x+5}.$$

Чтобы найти неизвестное x , необходимо приравнять степени:

$$3 + 2x^2 + 8 = x^2 + 5x + 5.$$

Перенесем все члены уравнения в левую часть:

$$3 + 2x^2 + 8 - x^2 - 5x - 5 = 0$$

и получим квадратное уравнение: $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Так как коэффициент при $x^2 = 1$, то найдем корни уравнения по теореме Виета. Согласно данной теореме, $x_1 \cdot x_2 = 6$, $x_1 + x_2 = 5$.

Получаем: $x_1 = 2$, $x_2 = 3$.

По условию задачи, в ответ необходимо записать сумму корней: $2 + 3 = 5$.

Правильный ответ: 5.

(8 баллов)

Вопрос 15

Найдите $3 \cos(\pi - \beta) + 21 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)$, если $\cos \beta = \frac{1}{3}$.

Ответ запишите в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

Решение

Для решения данной задачи воспользуемся тригонометрическими формулами:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta,$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta.$$

Запишем $\cos(\pi - \beta)$ в соответствии с формулой косинуса разности углов:

$$\cos(\pi - \beta) = \cos \pi \cdot \cos \beta + \sin \pi \cdot \sin \beta.$$

Известно, что $\cos \pi = -1$, $\sin \pi = 0$. Также по условию задачи задано:

$$\cos \beta = \frac{1}{3}.$$

В соответствии с этим перепишем выражение:

$$\cos(\pi - \beta) = \cos \pi \cdot \cos \beta + \sin \pi \cdot \sin \beta = -1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \sin \beta = -\frac{1}{3}.$$

Запишем $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)$ в соответствии с формулой синуса разности углов:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \cos \beta - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin \beta.$$

Известно, что $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. Также по условию задачи задано:

$$\cos \beta = \frac{1}{3}.$$

В соответствии с этим перепишем выражение:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = 1 \cdot \frac{1}{3} - 0 \cdot \sin \beta = \frac{1}{3}.$$

Подставим полученные значения в исходное выражение и получим окончательный ответ:

$$3\cos(\pi - \beta) + 21\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = 3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 21 \cdot \frac{1}{3} = -1 + 7 = 6.$$

Правильный ответ: 6.

(12 баллов)

Вопрос 16

Найдите все значения a , при которых уравнение $(a - 2)x^2 + 2(a - 2)x + 2 = 0$ не имеет действительных корней.

- a) $a \in [2; 4)$
- b) $a \in (2; 4)$
- c) $a \in [2; 4]$
- d) $a = 1$
- e) $a = 2$
- f) $a > \frac{11}{9}$
- g) $a \in [3; 3.75]$
- h) $a > 6$
- i) $a = -12$

Решение

Имеем дело с квадратным уравнением, однако в случае, когда коэффициент при x^2 равен нулю, уравнение станет линейным. Рассмотрим два случая: 1) уравнение линейное и 2) уравнение квадратное.

1. Уравнение будет линейным, если $(a - 2) = 0$, то есть $a = 2$. При данном значении параметра a уравнение примет вид: $2 = 0$. Оно не имеет действительных корней. Один из ответов на поставленный в задаче вопрос найден.

2. Уравнение будет квадратным, если $a \neq 2$. Оно не имеет действительных корней тогда и только тогда, когда его дискриминант отрицателен. Найдем дискриминант:

$$D = b^2 - 4ac = 4(a - 2)^2 - 8(a - 2) < 0.$$

$$(a - 2)(a - 4) < 0.$$

Решение данного неравенства: $a \in (2; 4)$.

С учетом пункта 1 получаем ответ: $a \in [2; 4)$.

Правильный ответ: $a \in [2; 4)$.

(13 баллов)

Вопрос 17

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $\sqrt{x+2a-1} + \sqrt{x-a} = 1$ имеет хотя бы один корень.

a) $0 \leq a \leq \frac{2}{3}$

b) $a \in (2; 4)$

c) $a \in [2; 4)$

d) $a = 1$

e) $a = 2$

f) $a < \frac{2}{3}$

g) $a \in \left[-\frac{2}{3}; 0\right]$

h) $a > 6$

i) $a = -12$

Решение

Сделаем замену переменных: $\sqrt{x+2a-1} = t$, $\sqrt{x-a} = z$, где $t \geq 0$ и $z \geq 0$.

Тогда $x+2a-1 = t^2$, $x-a = z^2$.

Выразим из обоих уравнений x и приравняем:

$$x = t^2 + 1 - 2a$$

$$x = z^2 + a$$

$$t^2 + 1 - 2a = z^2 + a$$

Исходное уравнение с учетом замены получилось таким: $t + z = 1$.

Получаем систему уравнений:
$$\begin{cases} t + z = 1, \\ t^2 + 1 - 3a = z^2. \end{cases}$$

Эта система должна иметь хотя бы одно решение – такое, что $t \geq 0$, $z \geq 0$.

Из первого уравнения найдем z : $t = 1 - z \Rightarrow 1 - z \geq 0 \Rightarrow z \leq 1$. Аналогично $t \leq 1$.

Второе уравнение:

$$t^2 - z^2 = 3a - 1$$

$$(t - z)(t + z) = 3a - 1$$

Получим систему:
$$\begin{cases} t + z = 1, \\ (t - z)(t + z) = 3a - 1. \end{cases}$$

Найдем сумму и разность уравнений системы и получим:
$$\begin{cases} t = \frac{3}{2}a, \\ z = \frac{2 - 3a}{2}. \end{cases}$$

Нужно найти, при каких значениях параметра a система имеет хотя бы одно решение: $0 \leq t \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$.

Запишем условия для параметра:
$$\begin{cases} 0 \leq 3a \leq 2, \\ 0 \leq \frac{2 - 3a}{2} \leq 1. \end{cases}$$

Найдем решения обоих неравенств. Оба неравенства дают решение:

$$0 \leq a \leq \frac{2}{3}.$$

При этом $0 \leq t \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ исходное уравнение имеет хотя бы одно решение.

Правильный ответ: $0 \leq a \leq \frac{2}{3}$.

(13 баллов)

Вариант 7
(с решениями)

Вопрос 1

Найдите наибольший общий делитель натуральных чисел: 200 и 15.

Решение

Разобьем решение на несколько шагов.

Первый шаг: найдем наибольший общий делитель чисел с помощью разложения на простые множители. Для этого каждое число будем делить на простой множитель до того момента, пока остаток не станет равен 1. Оформим деление в столбик.

Число	Делители	Число	Делители
200	2	15	5
100	2	3	3
50	2	1	
25	5		
5	5		
1			

Запишем разложение на простые множители в строчку:

$$200 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5$$

$$15 = 5 \cdot 3$$

Второй шаг: подчеркнем общие простые множители:

$$200 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \underline{5} \cdot 5$$

$$15 = \underline{5} \cdot 3$$

Третий шаг: найдем произведение подчеркнутых простых множителей одного числа. Оно и будет являться наибольшим общим делителем двух чисел.

5 – наибольший общий делитель чисел 200 и 15.

Правильный ответ: 5.

(3 балла)

Вопрос 2

Найдите значение выражения: $\left(\frac{4}{3} + \frac{1}{6}\right) \div \frac{1}{6}$.

Решение

Выражение, записанное в скобках, приведем к общему знаменателю, а деление на $\frac{1}{6}$ заменим умножением на число 6. Выполнив элементарные преобразования, получаем:

$$\left(\frac{4 \cdot 2 + 1 \cdot 1}{6}\right) \cdot 6 = \frac{9}{6} \cdot 6 = 9.$$

Правильный ответ: 9.

(3 балла)

Вопрос 3

Найдите значение выражения: $(4\sqrt{13} - 3) \cdot (4\sqrt{13} + 3)$.

Решение

Для нахождения значения данного выражения необходимо воспользоваться формулами сокращенного умножения. Разность квадратов определяется следующим образом: $a^2 - b^2 = (a - b) \cdot (a + b)$. В нашем случае: $a = 4\sqrt{13}$, $b = 3$. Подставив данные значения в формулу, получаем:

$$(4\sqrt{13} - 3) \cdot (4\sqrt{13} + 3) = (4\sqrt{13})^2 - 3^2 = 4^2 \cdot 13 - 9 = 208 - 9 = 199.$$

Правильный ответ: 199.

(3 балла)

Вопрос 4

Торт стоит 1200 руб. Именинникам пекарня делает скидку 10%. Сколько рублей стоит торт для именинника?

Решение


Найдем размер скидки в рублях, зная процент скидки и стоимость торта:
 $1200 \cdot 0,10 = 120$ руб. Следовательно, для именинника торт стоит: $1200 - 120 = 1080$ руб.

Правильный ответ: 1080.

(3 балла)

Вопрос 5

На графике изображена зависимость скорости движения рейсового автобуса от времени. На вертикальной оси отмечена скорость автобуса (км/ч), на горизонтальной – время (мин), прошедшее с начала движения автобуса.



Пользуясь графиком, укажите характеристику скорости движения рейсового автобуса для интервала времени 5–6 мин.

1. Была остановка длительностью 2 мин.
2. Скорость не меньше 20 км/ч на всем интервале.
3. Скорость не больше 60 км/ч.
4. Была остановка длительностью 1 мин.

Решение


Проанализируем варианты ответа и посмотрим на график в интервале 5–6 мин. Из графика видно, что на всем данном интервале скорость равна нулю. Следовательно, у автобуса на интервале 5–6 мин была остановка длительностью 1 мин.

Правильный ответ: 4.

(3 балла)

Вопрос 6

Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.



Характеристики функций:

1. Функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$.
2. Функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$.
3. Функция убывает на отрезке $[-1; 1]$.
4. Функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$.

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	Б	В	Г

Решение

Точка максимума – это такая внутренняя точка графика, что значение функции в ней больше, чем во всех достаточно близких к ней точках. На графике

выглядит как локальный «холмик». Следовательно, характеристике «функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой А.

Точка минимума – такая внутренняя точка графика, что значение функции в ней меньше, чем во всех достаточно близких к ней точках. На графике выглядит как локальная «ямка». Следовательно, характеристике «функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой Б.

Функция $y = f(x)$ убывает на множестве M , если для любых x_1 и x_2 , принадлежащих множеству M , из неравенства $x_2 > x_1$ следует неравенство $f(x_2) < f(x_1)$. Следовательно, характеристике «функция убывает на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой Г.

Функция $y = f(x)$ возрастает на множестве M , если для любых x_1 и x_2 , принадлежащих множеству M , из неравенства $x_2 > x_1$ следует неравенство $f(x_2) > f(x_1)$. Следовательно, характеристике «функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой В.

Правильный ответ:

А	Б	В	Г
1	2	4	3

(6 баллов)

Вопрос 7

Найдите значение выражения: $\frac{8\sin 10^\circ \cdot \cos 10^\circ}{\sin 20^\circ}$.

Решение

Воспользуемся тригонометрической формулой двойного угла:

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha.$$

Числитель выражения в соответствии с формулой двойного угла преобразуется следующим образом:

$$8\sin 10^\circ \cdot \cos 10^\circ = 4 \cdot 2 \cdot \sin 10^\circ \cdot \cos 10^\circ = 4 \cdot \sin(2 \cdot 10^\circ) = 4\sin 20^\circ.$$

Подставим полученное выражение в исходное вместо числителя, в итоге получим:

$$\frac{8 \sin 10^\circ \cdot \cos 10^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{4 \sin 20^\circ}{\sin 20^\circ} = 4.$$

Правильный ответ: 4.

(3 балла)

Вопрос 8

Решите уравнение: $x^2 + 2x - 15 = 0$.

Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них.

Решение

Если в квадратном уравнении вида: $ax^2 + bx + c = 0$ коэффициент $a = 1$, то можно воспользоваться теоремой Виета. Согласно данной теореме, произведение корней равно свободному члену c , а сумма корней коэффициенту b , взятому с противоположным знаком. То есть $x_1 \cdot x_2 = c$, $x_1 + x_2 = -b$. Зададимся вопросом: произведение каких двух чисел равно 15? Очевидно, что это числа -5 и 3 или 5 и -3 . По теореме Виета, сумма корней должны быть равна коэффициенту b , взятому с противоположным знаком. Коэффициент $b = 2$. Сумма корней должна быть равна -2 . Значит, корни уравнения будут такими: $x_1 = -5$, $x_2 = 3$. В задаче требуется в качестве ответа указать больший корень. Больший корень = 3 .

Правильный ответ: 3.

(4 балла)

Вопрос 9

Решите систему уравнений:
$$\begin{cases} 10x + 2y = 24, \\ 3x + y = 14. \end{cases}$$

Укажите в ответе, чему равен y .

Решение

Распишем решение по шагам.

Первый шаг. Выразим из второго уравнения системы y .

$$y = 14 - 3x$$

Второй шаг. Подставим полученное выражение в первое уравнение вместо y и найдем x .

$$10x + 2(14 - 3x) = 24$$

$$10x + 28 - 6x = 24$$

$$4x = 24 - 28$$

$$4x = -4$$

$$x = -1$$

Третий шаг. Подставим найденное значение x в выражение для y , полученное на первом шаге, и найдем y .

$$y = 14 - 3x = 14 - 3 \cdot (-1) = 14 + 3 = 17.$$

В задаче требуется в качестве ответа указать, чему равен y . Получили $y = 17$.

Правильный ответ: 17.

(4 балла)

Вопрос 10

Решите неравенство: $3x + 4(8x + 10) < 180$.

a) $x > 4$

b) $x > 2$

c) $x < 4$

d) $x > 1$

Решение

Чтобы решить неравенство, сначала нужно решить соответствующее уравнение:

$$3x + 4(8x + 10) = 180$$

$$3x + 32x + 40 = 180$$

$$35x = 140. \text{ Откуда } x = 4.$$

Данный корень является точкой смены знака в неравенстве. Возьмем точку, расположенную на числовой оси левее точки $x = 4$. Одной из таких точек будет точка $x = 0$. Подставим $x = 0$ в исходное неравенство и проверим знак.

$$3 \cdot 0 + 4(8 \cdot 0 + 10) < 180$$

$$0 + 4(0 + 10) < 180$$

$$40 < 180$$

Видно, что неравенство выполняется. Следовательно, решение неравенства будет на числовой оси левее точки $x = 4$, то есть при $x < 4$.

Правильный ответ: $x < 4$.

(4 балла)

Вопрос 11

Найдите производную функции: $f(x) = 2x^5 - 3x^3 + x^2 - 5x$. В ответ запишите значение производной в точке $x = 1$.

Решение

Для нахождения производной воспользуемся таблицей производных.

Найдем в таблице производную степенной функции: $(x^n)' = nx^{n-1}$. Учтем, что производная константы равна нулю. А также то, что производная алгебраической суммы нескольких функций равна алгебраической сумме производных этих функций, то есть $(U + V)' = U' + V'$.

Следовательно, производная функции $f(x)$ равна:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2(x^5)' - 3(x^3)' + (x^2)' - 5(x)' = 2 \cdot 5x^{5-1} - 3 \cdot 3x^{3-1} + 2 \cdot x^{2-1} - 5 \cdot 1 = \\ &= 10x^4 - 9x^2 + 2x - 5. \end{aligned}$$

Вычислим значение производной функции в точке $x = 1$. Для этого подставим в полученную производную: $x = 1$.


$$f'(1) = 10 \cdot 1^4 - 9 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 - 5 = 10 - 9 + 2 - 5 = -2.$$

Правильный ответ: -2 .

(6 баллов)

Вопрос 12

Даны два шара радиусами 16 и 8. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего?



Решение

Применим формулу для нахождения площади поверхности шара: $S = 4\pi R^2$. Обозначим площадь поверхности большего шара и его радиус – S_2 и R_2 , площадь поверхности меньшего шара и его радиус – S_1 и R_1 . Запишем отношение площади большего шара к площади меньшего шара, подставив в формулу радиусы шаров:

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{4\pi R_2^2}{4\pi R_1^2} = \frac{R_2^2}{R_1^2} = \frac{16^2}{8^2} = \frac{256}{64} = 4.$$

Получили, что площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего шара в 4 раза.

Правильный ответ: 4.

(4 балла)


Вопрос 13

В треугольнике ABC угол A равен 90° , $\operatorname{tg}B = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $AC = 6$. Найдите BC .

Ответ запишите в виде целого числа или конечной десятичной дроби, округлив до двух знаков после запятой.

Решение

Для наглядности построим прямоугольный треугольник:



Известно, что катет прямоугольного треугольника равен произведению гипотенузы на синус противолежащего ему угла. Длина катета AC известна по условию задачи, также известен тангенс противолежащего этому катету угла B . Следовательно, найдя угол B , мы сможем вычислить гипотенузу. По условию задачи,

$\operatorname{tg}B = \frac{\sqrt{3}}{3}$, значит, угол $B = \operatorname{arctg}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{\pi}{6}$. Запишем выражение в соответствии

с тем, что катет прямоугольного треугольника равен произведению гипотенузы на синус противолежащего ему угла: $AC = BC \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

Известно, что $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$, а катет $AC = 6$ по условию задачи. Получаем:

$6 = BC \cdot \frac{1}{2}$. Из данного выражения находим BC : $BC = 2 \cdot 6 = 12$.

Правильный ответ: 12.

(8 баллов)

Вопрос 14

Решите уравнение: $4 \cdot 2^{2x^2-4x} = 2^{x^2-2x+10}$. Если уравнение имеет более одного корня, то в ответе запишите сумму всех его корней.

Решение

Легко заметить, что число 4 можно представить следующим образом: $4 = 2^2$. С учетом этого факта перепишем уравнение в следующем виде:

$$2^2 \cdot 2^{2x^2-4x} = 2^{x^2-2x+10}.$$

Известно, что при умножении степеней с одинаковыми основаниями основание оставляем без изменений, а показатели степеней складываем. Соответственно, выражение принимает вид:

$$2^{2x^2-4x+2} = 2^{x^2-2x+10}.$$

Чтобы найти неизвестное x , необходимо приравнять степени:

$$2x^2 - 4x + 2 = x^2 - 2x + 10.$$

Перенесем все члены уравнения в левую часть:

$$2x^2 - 4x + 2 - x^2 + 2x - 10 = 0$$

и получим квадратное уравнение:

$$x^2 - 2x - 8 = 0.$$

Так как коэффициент при $x^2 = 1$, то найдем корни уравнения по теореме Виета. Согласно данной теореме, $x_1 \cdot x_2 = -8$, $x_1 + x_2 = 2$.

Получаем: $x_1 = -2$, $x_2 = 4$.

По условию задачи, в ответ необходимо записать сумму корней:

$$4 + (-2) = 2.$$

Правильный ответ: 2.

(8 баллов)

Вопрос 15

Найдите $6 \cos(\pi - \beta) + 45 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)$, если $\cos \beta = \frac{1}{3}$.

Ответ запишите в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

Решение

Для решения данной задачи воспользуемся тригонометрическими формулами:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta,$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta.$$

Запишем $\cos(\pi - \beta)$ в соответствии с формулой косинуса разности углов:

$$\cos(\pi - \beta) = \cos \pi \cdot \cos \beta + \sin \pi \cdot \sin \beta.$$

Известно, что $\cos \pi = -1$, $\sin \pi = 0$. Также по условию задачи задано:

$$\cos \beta = \frac{1}{3}.$$

В соответствии с этим перепишем выражение:

$$\cos(\pi - \beta) = \cos \pi \cdot \cos \beta + \sin \pi \cdot \sin \beta = -1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \sin \beta = -\frac{1}{3}.$$

Запишем $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)$ в соответствии с формулой синуса разности углов:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \cos \beta - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin \beta.$$

Известно, что $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. Также по условию задачи задано:

$$\cos \beta = \frac{1}{3}.$$

В соответствии с этим перепишем выражение:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = 1 \cdot \frac{1}{3} - 0 \cdot \sin \beta = \frac{1}{3}.$$

Подставим полученные значения в исходное выражение и получим окончательный ответ:

$$6\cos(\pi - \beta) + 45\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = 6 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 45 \cdot \frac{1}{3} = -2 + 15 = 13.$$

Правильный ответ: 13.

(12 баллов)

Вопрос 16

Найдите все значения a , при которых уравнение $(a - 2)x^2 + 2(a - 2)x + 2 = 0$ не имеет действительных корней.

- a) $a \in [2; 4)$
- b) $a \in (2; 4)$
- c) $a \in [2; 4]$
- d) $a = 1$
- e) $a = 2$
- f) $a > \frac{11}{9}$
- g) $a \in [3; 3.75]$
- h) $a > 6$
- i) $a = -12$

Решение

Имеем дело с квадратным уравнением, однако в случае, когда коэффициент при x^2 равен нулю, уравнение станет линейным. Рассмотрим два случая: 1) уравнение линейное и 2) уравнение квадратное.

1. Уравнение будет линейным, если $(a - 2) = 0$, то есть $a = 2$. При данном значении параметра a уравнение примет вид: $2 = 0$. Оно не имеет действительных корней. Один из ответов на поставленный в задаче вопрос найден.

2. Уравнение будет квадратным, если $a \neq 2$. Оно не имеет действительных корней тогда и только тогда, когда его дискриминант отрицателен. Найдем дискриминант:

$$D = b^2 - 4ac = 4(a - 2)^2 - 8(a - 2) < 0.$$

$$(a - 2)(a - 4) < 0.$$

Решение данного неравенства: $a \in (2; 4)$.

С учетом пункта 1 получаем ответ: $a \in [2; 4)$.

Правильный ответ: $a \in [2; 4)$.

(13 баллов)

Вопрос 17

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $\sqrt{x + 2a - 1} + \sqrt{x - a} = 1$ имеет хотя бы один корень.

a) $0 \leq a \leq \frac{2}{3}$

b) $a \in (2; 4)$

c) $a \in [2; 4)$

d) $a = 1$

e) $a = 2$

f) $a < \frac{2}{3}$

g) $a \in \left[-\frac{2}{3}; 0 \right]$

h) $a > 6$

i) $a = -12$

Решение

Сделаем замену переменных: $\sqrt{x+2a-1}=t$, $\sqrt{x-a}=z$, где $t \geq 0$ и $z \geq 0$.

Тогда $x+2a-1=t^2$, $x-a=z^2$.

Выразим из обоих уравнений x и приравняем:

$$x = t^2 + 1 - 2a$$

$$x = z^2 + a$$

$$t^2 + 1 - 2a = z^2 + a$$

Исходное уравнение с учетом замены получилось таким: $t + z = 1$.

Получаем систему уравнений:
$$\begin{cases} t + z = 1, \\ t^2 + 1 - 3a = z^2. \end{cases}$$

Эта система должна иметь хотя бы одно решение – такое, что $t \geq 0$, $z \geq 0$.

Из первого уравнения найдем z : $t = 1 - z \Rightarrow 1 - z \geq 0 \Rightarrow z \leq 1$. Аналогично $t \leq 1$.

Второе уравнение:

$$t^2 - z^2 = 3a - 1$$

$$(t - z)(t + z) = 3a - 1$$

Получим систему:
$$\begin{cases} t + z = 1, \\ (t - z)(t + z) = 3a - 1. \end{cases}$$

Найдем сумму и разность уравнений системы и получим:
$$\begin{cases} t = \frac{3}{2}a, \\ z = \frac{2 - 3a}{2}. \end{cases}$$

Нужно найти, при каких значениях параметра a система имеет хотя бы одно решение: $0 \leq t \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$.

Запишем условия для параметра:
$$\begin{cases} 0 \leq 3a \leq 2, \\ 0 \leq \frac{2 - 3a}{2} \leq 1. \end{cases}$$

Найдем решения обоих неравенств. Оба неравенства дают решение:

$$0 \leq a \leq \frac{2}{3}.$$

При этом $0 \leq t \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ исходное уравнение имеет хотя бы одно решение.

Правильный ответ: $0 \leq a \leq \frac{2}{3}$.

(13 баллов)

Вариант 8
(с решениями)

Вопрос 1

Найдите наибольший общий делитель натуральных чисел: 200 и 125.

Решение

Разобьем решение на несколько шагов.

Первый шаг: найдем наибольший общий делитель чисел с помощью разложения на простые множители. Для этого каждое число будем делить на простой множитель до того момента, пока остаток не станет равен 1. Оформим деление в столбик.

Число	Делители	Число	Делители
200	2	125	5
100	2	25	5
50	2	5	5
25	5	1	
5	5		
1			

Запишем разложение на простые множители в строчку:

$$200 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5$$

$$125 = 5 \cdot 5 \cdot 5$$

Второй шаг: подчеркнем общие простые множители:

$$200 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \underline{5} \cdot \underline{5}$$

$$125 = \underline{5} \cdot \underline{5} \cdot 5$$

Третий шаг: найдем произведение подчеркнутых простых множителей одного числа. Оно и будет являться наибольшим общим делителем двух чисел.

$$5 \cdot 5 = 25 \text{ – наибольший общий делитель чисел 200 и 125.}$$

Правильный ответ: 25.

(3 балла)

Вопрос 2

Найдите значение выражения: $\left(\frac{4}{3} + \frac{2}{6}\right) \div \frac{1}{6}$.

Решение

Выражение, записанное в скобках, приведем к общему знаменателю, а деление на $\frac{1}{6}$ заменим умножением на число 6. Выполнив элементарные преобразования, получаем:

$$\left(\frac{4 \cdot 2 + 2 \cdot 1}{6}\right) \cdot 6 = \frac{10}{6} \cdot 6 = 10.$$

Правильный ответ: 10.

(3 балла)

Вопрос 3

Найдите значение выражения: $(3\sqrt{13} - 3) \cdot (3\sqrt{13} + 3)$.

Решение

Для нахождения значения данного выражения необходимо воспользоваться формулами сокращенного умножения. Разность квадратов определяется следующим образом: $a^2 - b^2 = (a - b) \cdot (a + b)$. В нашем случае: $a = 3\sqrt{13}$, $b = 3$. Подставив данные значения в формулу, получаем:

$$(3\sqrt{13} - 3) \cdot (3\sqrt{13} + 3) = (3\sqrt{13})^2 - 3^2 = 3^2 \cdot 13 - 9 = 117 - 9 = 108.$$

Правильный ответ: 108.

(3 балла)

Вопрос 4

Торт стоит 1500 руб. Студентам пекарня делает скидку 5%. Сколько рублей стоит торт для студента?

Решение


Найдем размер скидки в рублях, зная процент скидки и стоимость торта:
 $1500 \cdot 0,05 = 75$ руб. Следовательно, для студента торт стоит: $1500 - 75 = 1425$ руб.

Правильный ответ: 1425.

(3 балла)

Вопрос 5

На графике изображена зависимость скорости движения рейсового автобуса от времени. На вертикальной оси отмечена скорость автобуса (км/ч), на горизонтальной – время (мин), прошедшее с начала движения автобуса.



Пользуясь графиком, укажите характеристику скорости движения рейсового автобуса для интервала времени 14–16 мин.

1. Была остановка длительностью 2 мин.
2. Скорость не меньше 20 км/ч на всем интервале.
3. Скорость не больше 60 км/ч.
4. Была остановка длительностью ровно 1 мин.

Решение

Проанализируем варианты ответа и посмотрим на график в интервале 14–16 мин. Варианты 1, 4 неверные, так как на всем интервале 14–16 мин нет участков, на которых скорость была бы равна нулю. Вариант 3 тоже неверный,


так как максимальная скорость на интервале 14–16 мин составляет 100 км/ч. Проверим вариант 2. По графику видим, что минимальная скорость на интервале 14–16 составляет 20 км/ч (в момент времени = 16 мин). В остальные интервалы времени скорость выше 20 км/ч. Следовательно, можно сделать вывод о том, что на всем интервале 14–16 скорость автобуса не меньше 20 км/ч.

Правильный ответ: 2.

(3 балла)

Вопрос 6

Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.



Характеристики функций:

1. Функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$.
2. Функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$.
3. Функция убывает на отрезке $[-1; 1]$.
4. Функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$.

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	Б	В	Г

Решение

Точка максимума – это такая внутренняя точка графика, что значение функции в ней больше, чем во всех достаточно близких к ней точках. На графике

выглядит как локальный «холмик». Следовательно, характеристике «функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой А.

Точка минимума – такая внутренняя точка графика, что значение функции в ней меньше, чем во всех достаточно близких к ней точках. На графике выглядит как локальная «ямка». Следовательно, характеристике «функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой Б.

Функция $y = f(x)$ убывает на множестве M , если для любых x_1 и x_2 , принадлежащих множеству M , из неравенства $x_2 > x_1$ следует неравенство $f(x_2) < f(x_1)$. Следовательно, характеристике «функция убывает на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой Г.

Функция $y = f(x)$ возрастает на множестве M , если для любых x_1 и x_2 , принадлежащих множеству M , из неравенства $x_2 > x_1$ следует неравенство $f(x_2) > f(x_1)$. Следовательно, характеристике «функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$ » соответствует график под буквой В.

Правильный ответ:

А	Б	В	Г
1	2	4	3

(6 баллов)

Вопрос 7

Найдите значение выражения: $\frac{10 \sin 5^\circ \cdot \cos 5^\circ}{\sin 10^\circ}$.

Решение

Воспользуемся тригонометрической формулой двойного угла:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha.$$

Числитель выражения в соответствии с формулой двойного угла преобразуется следующим образом:

$$10 \sin 5^\circ \cdot \cos 5^\circ = 5 \cdot 2 \cdot \sin 5^\circ \cdot \cos 5^\circ = 5 \cdot \sin(2 \cdot 5^\circ) = 5 \sin 10^\circ.$$

Подставим полученное выражение в исходное вместо числителя, в итоге получим:

$$\frac{10\sin 5^\circ \cdot \cos 5^\circ}{\sin 10^\circ} = \frac{5\sin 10^\circ}{\sin 10^\circ} = 5.$$

Правильный ответ: 5.

(3 балла)

Вопрос 8

Решите уравнение: $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них.

Решение

Если в квадратном уравнении вида: $ax^2 + bx + c = 0$ коэффициент $a = 1$, то можно воспользоваться теоремой Виета. Согласно данной теореме, произведение корней равно свободному члену c , а сумма корней коэффициенту b , взятому с противоположным знаком. То есть $x_1 \cdot x_2 = c$, $x_1 + x_2 = -b$. Зададимся вопросом: произведение каких двух чисел равно 6? Очевидно, что это числа 2 и 3 или -2 и -3 . По теореме Виета, сумма корней должны быть равна коэффициенту b , взятому с противоположным знаком. Коэффициент $b = -5$. Сумма корней должна быть равна 5. Значит, корни уравнения будут такими: $x_1 = 2$, $x_2 = 3$. В задаче требуется в качестве ответа указать больший корень. Больший корень = 3.

Правильный ответ: 3.

(4 балла)

Вопрос 9

Решите систему уравнений:
$$\begin{cases} 10x + 2y = 24, \\ 3x + y = 4. \end{cases}$$

Укажите в ответе, чему равен y .

Решение

Распишем решение по шагам.

Первый шаг. Выразим из второго уравнения системы y .

$$y = 4 - 3x$$

Второй шаг. Подставим полученное выражение в первое уравнение вместо y и найдем x .

$$10x + 2(4 - 3x) = 24$$

$$10x + 8 - 6x = 24$$

$$4x = 24 - 8$$

$$4x = 16$$

$$x = 4$$

Третий шаг. Подставим найденное значение x в выражение для y , полученное на первом шаге, и найдем y .

$$y = 4 - 3x = 4 - 3 \cdot 4 = 4 - 12 = -8.$$

В задаче требуется в качестве ответа указать, чему равен y . Получили $y = -8$.

Правильный ответ: -8 .

(4 балла)

Вопрос 10

Решите неравенство: $3x + 4(8x + 10) > 180$.

- a) $x > 4$
- b) $x > 2$
- c) $x < 4$
- d) $x > 1$

Решение

Чтобы решить неравенство, сначала нужно решить соответствующее уравнение:

$$3x + 4(8x + 10) = 180$$

$$3x + 32x + 40 = 180$$

$$35x = 140. \text{ Откуда } x = 4.$$

Данный корень является точкой смена знака в неравенстве. Возьмем точку, расположенную на числовой оси левее точки $x = 4$. Одной из таких точек будет точка $x = 0$. Подставим $x = 0$ в исходное неравенство и проверим знак.

$$3 \cdot 0 + 4(8 \cdot 0 + 10) > 180$$

$$0 + 4(0 + 10) > 180$$

$$40 > 180$$

Видно, что неравенство не выполняется. Следовательно, решение неравенства будет на числовой оси правее точки $x = 4$, то есть при $x > 4$.

Правильный ответ: $x > 4$.

(4 балла)

Вопрос 11

Найдите производную функции: $f(x) = 2x^4 - 3x^2 + 5x$. В ответ запишите значение производной в точке $x = 2$.

Решение

Для нахождения производной воспользуемся таблицей производных.

Найдем в таблице производную степенной функции: $(x^n)' = nx^{n-1}$. Учтем, что производная константы равна нулю. А также то, что производная алгебраической суммы нескольких функций равна алгебраической сумме производных этих функций, то есть $(U + V)' = U' + V'$.

Следовательно, производная функции $f(x)$ равна:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2(x^4)' - 3(x^2)' + 5(x)' = 2 \cdot 4x^{4-1} - 3 \cdot 2x^{2-1} + 5 \cdot 1x^{1-1} = \\ &= 8x^3 - 6x + 5. \end{aligned}$$

Вычислим значение производной функции в точке $x = 2$. Для этого подставим в полученную производную: $x = 2$.


$$f'(2) = 8 \cdot 2^3 - 6 \cdot 2 + 5 = 64 - 12 + 5 = 57.$$

Правильный ответ: 57.

(6 баллов)

Вопрос 12

Даны два шара радиусами 25 и 5. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего?



Решение

Применим формулу для нахождения площади поверхности шара: $S = 4\pi R^2$. Обозначим площадь поверхности большего шара и его радиус – S_2 и R_2 , площадь поверхности меньшего шара и его радиус – S_1 и R_1 . Запишем отношение площади большего шара к площади меньшего шара, подставив в формулу радиусы шаров:

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{4\pi R_2^2}{4\pi R_1^2} = \frac{R_2^2}{R_1^2} = \frac{25^2}{5^2} = \frac{625}{25} = 25.$$

Получили, что площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего шара в 25 раз.

Правильный ответ: 25.

(4 балла)


Вопрос 13

В треугольнике ABC угол A равен 90° , $\operatorname{ctg} B = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $AC = \frac{6}{\sqrt{3}}$. Найдите BC .

Ответ запишите в виде целого числа или конечной десятичной дроби, округлив до двух знаков после запятой.

Решение

Для наглядности построим прямоугольный треугольник:



Известно, что катет прямоугольного треугольника равен произведению гипотенузы на синус противолежащего ему угла. Длина катета AC известна по условию задачи, также известен тангенс противолежащего этому катету угла B . Следовательно, найдя угол B , мы сможем вычислить гипотенузу. По условию задачи, $\operatorname{ctg} B = \frac{\sqrt{3}}{3}$, значит, угол $B = \operatorname{arccotg}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{\pi}{3}$. Запишем выражение в соответствии с тем, что катет прямоугольного треугольника равен произведению гипотенузы на синус противолежащего ему угла: $AC = BC \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

Известно, что $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, а катет $AC = \frac{6}{\sqrt{3}}$ по условию задачи. Получаем: $\frac{6}{\sqrt{3}} = BC \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$. Из данного выражения находим BC : $\sqrt{3} \cdot BC \cdot \sqrt{3} = 2 \cdot 6$.
 $3BC = 12 \Rightarrow BC = 4$.

Правильный ответ: 4.

(8 баллов)

Вопрос 14

Решите уравнение: $4 \cdot 2^{2x^2-4x} = 2^{x^2-5x+8}$. Если уравнение имеет более одного корня, то в ответе запишите сумму всех его корней.

Решение

Легко заметить, что число 4 можно представить следующим образом: $4 = 2^2$. С учетом этого факта перепишем уравнение в следующем виде:

$$2^2 \cdot 2^{2x^2-4x} = 2^{x^2-5x+8}.$$

Известно, что при умножении степеней с одинаковыми основаниями основание оставляем без изменений, а показатели степеней складываем. Соответственно, выражение принимает вид:

$$2^{2x^2-4x+2} = 2^{x^2-5x+8}.$$

Чтобы найти неизвестное x , необходимо приравнять степени:

$$2x^2 - 4x + 2 = x^2 - 5x + 8.$$

Перенесем все члены уравнения в левую часть:

$$2x^2 - 4x + 2 - x^2 + 5x - 8 = 0$$

и получим квадратное уравнение: $x^2 + x - 6 = 0$.

Так как коэффициент при $x^2 = 1$, то найдем корни уравнения по теореме Виета. Согласно данной теореме, $x_1 \cdot x_2 = -6$, $x_1 + x_2 = -1$.

Получаем: $x_1 = 2$, $x_2 = -3$.

По условию задачи, в ответ необходимо записать сумму корней:

$$2 + (-3) = -1.$$

Правильный ответ: -1 .

(8 баллов)

Вопрос 15

Найдите $3\cos(\pi - \beta) + 18\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)$, если $\cos\beta = \frac{1}{3}$.

Ответ запишите в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

Решение

Для решения данной задачи воспользуемся тригонометрическими формулами:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta,$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta.$$

Запишем $\cos(\pi - \beta)$ в соответствии с формулой косинуса разности углов:

$$\cos(\pi - \beta) = \cos \pi \cdot \cos \beta + \sin \pi \cdot \sin \beta.$$

Известно, что $\cos \pi = -1$, $\sin \pi = 0$. Также по условию задачи задано:

$$\cos \beta = \frac{1}{3}.$$

В соответствии с этим перепишем выражение:

$$\cos(\pi - \beta) = \cos \pi \cdot \cos \beta + \sin \pi \cdot \sin \beta = -1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \sin \beta = -\frac{1}{3}.$$

Запишем $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)$ в соответствии с формулой синуса разности углов:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \cos \beta - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin \beta.$$

Известно, что $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. Также по условию задачи задано:

$$\cos \beta = \frac{1}{3}.$$

В соответствии с этим перепишем выражение:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = 1 \cdot \frac{1}{3} - 0 \cdot \sin \beta = \frac{1}{3}.$$

Подставим полученные значения в исходное выражение и получим окончательный ответ:

$$3 \cos(\pi - \beta) + 18 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = 3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 18 \cdot \frac{1}{3} = -1 + 6 = 5.$$

Правильный ответ: 5.

(12 баллов)

Вопрос 16

Найдите все значения a , при которых уравнение $(a-2)x^2 + 2(a-2)x + 2 = 0$ не имеет действительных корней.

a) $a \in [2; 4)$

b) $a \in (2; 4)$

c) $a \in [2; 4]$

d) $a = 1$

e) $a = 2$

f) $a > \frac{11}{9}$

g) $a \in [3; 3.75]$

h) $a > 6$

i) $a = -12$

Решение

Имеем дело с квадратным уравнением, однако в случае, когда коэффициент при x^2 равен нулю, уравнение станет линейным. Рассмотрим два случая: 1) уравнение линейное и 2) уравнение квадратное.

1. Уравнение будет линейным, если $(a-2) = 0$, то есть $a = 2$. При данном значении параметра a уравнение примет вид: $2 = 0$. Оно не имеет действительных корней. Один из ответов на поставленный в задаче вопрос найден.

2. Уравнение будет квадратным, если $a \neq 2$. Оно не имеет действительных корней тогда и только тогда, когда его дискриминант отрицателен. Найдем дискриминант:

$$D = b^2 - 4ac = 4(a-2)^2 - 8(a-2) < 0.$$

$$(a-2)(a-4) < 0.$$

Решение данного неравенства: $a \in (2; 4)$.

С учетом пункта 1 получаем ответ: $a \in [2; 4)$.

Правильный ответ: $a \in [2; 4)$.

(13 баллов)

Вопрос 17

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $\sqrt{x+2a-1} + \sqrt{x-a} = 1$ имеет хотя бы один корень.

a) $0 \leq a \leq \frac{2}{3}$

b) $a \in (2; 4)$

c) $a \in [2; 4)$

d) $a = 1$

e) $a = 2$

f) $a < \frac{2}{3}$

g) $a \in \left[-\frac{2}{3}; 0\right]$

h) $a > 6$

i) $a = -12$

Решение

Сделаем замену переменных: $\sqrt{x+2a-1} = t$, $\sqrt{x-a} = z$, где $t \geq 0$ и $z \geq 0$.

Тогда $x+2a-1 = t^2$, $x-a = z^2$.

Выразим из обоих уравнений x и приравняем:

$$x = t^2 + 1 - 2a$$

$$x = z^2 + a$$

$$t^2 + 1 - 2a = z^2 + a$$

Исходное уравнение с учетом замены получилось таким: $t + z = 1$.

Получаем систему уравнений:
$$\begin{cases} t + z = 1, \\ t^2 + 1 - 3a = z^2. \end{cases}$$

Эта система должна иметь хотя бы одно решение – такое, что $t \geq 0$, $z \geq 0$.

Из первого уравнения найдем z : $t = 1 - z \Rightarrow 1 - z \geq 0 \Rightarrow z \leq 1$. Аналогично $t \leq 1$.

Второе уравнение:

$$t^2 - z^2 = 3a - 1$$

$$(t - z)(t + z) = 3a - 1$$

Получим систему:
$$\begin{cases} t + z = 1, \\ (t - z)(t + z) = 3a - 1. \end{cases}$$

Найдем сумму и разность уравнений системы и получим:
$$\begin{cases} t = \frac{3}{2}a, \\ z = \frac{2 - 3a}{2}. \end{cases}$$

Нужно найти, при каких значениях параметра a система имеет хотя бы одно решение: $0 \leq t \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$.

Запишем условия для параметра:
$$\begin{cases} 0 \leq 3a \leq 2, \\ 0 \leq \frac{2 - 3a}{2} \leq 1. \end{cases}$$

Найдем решения обоих неравенств. Оба неравенства дают решение:

$$0 \leq a \leq \frac{2}{3}.$$

При этом $0 \leq t \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ исходное уравнение имеет хотя бы одно решение.

Правильный ответ: $0 \leq a \leq \frac{2}{3}$.

(13 баллов)